

DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES SALTICIDÆ (ATTIDÆ)

(SUITE) (1)

par E. Simon.

Cylodania (2) *bicrucata* sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, longe nigro-pilosus, vitta marginali albicinctus, parte cephalica vitta transversa latissima, medio interrupta, thoracica linea media longitudinali niveo-pilosis et pone oculos vitta transversa exiliore abbreviata fulvo-pilosa, ornatus. Pili oculorum pauci albidi. Clypeus dimidio oculorum mediorum latior, vitta latissima, sed marginem haud attingente, crasse niveo-pilosa subsquamulata, ornatus. Abdomen atrum, vitta media vittisque transversis, in medio ampliatis, testaceis et niveo-pilosis, supra ornatum, subtus albido-pilosum. Sternum nigro nitidum. Chelæ fusco-rufulæ, antice deplanatæ, leviter inæquales et rugosæ, curvatæ, ad basin atque ad apicem contiguæ, extus in parte basali sat angustæ, in parte apicali valde ampliatae, alte et acute carinatæ et angulosæ, margine sulci superiore valde prominulo et obtuso, inferiore brevi, tridentato. Pedes lutei, antici leviter infuscati, parce niveo-squamulati et subannulati, tibiis anticis aculeis brevibus 3-3, metatarsis aculeis 2-2 subtus armatis. Pedes-maxillares lutei, patella tibiaque supra crasse albo-pilosis; tibia patella paulo brevior et ad basin paulo angustior, apophysi apicali recta, acuta et sursum oblique directa extus armata; tarso anguste ovato; bulbo disciformi, stylo crasso, apice libero, leviter incrassato atque obtuso, omnino circumdato. — Venezuela : La Guaira!

Rhyphelia (3) *variegata* sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica pilis longis convergentibus aurantiacis vestita sed vitta media lata albo-pilosa, lineam rufulam

(1) Voir Ann. Soc. ent. Belg., t. XLIV (1900), p. 381; t. XLV (1901), p. 41 et t. XLVI (1902), p. 24.

(2) *Cylodania* nov. gen. a *Scopocira* E. Sim. C. (*Grauhara* Peckh.) differt clypeo latiore et crebre barbato, oculis ser. 2^e ante medium sitis sed ab oculis lateralibus anticis remotioribus, pedibus robustioribus, parte labiali longiore quam latiore, chelis maris sat longis sed verticalibus, valde incurvis atque extus angulose carinatis. — Typus : *C. bicrucata* E. Simon.

(3) *Rhyphelia* nov. gen. ab *Evophridi* differt quadrangulo oculorum postice quam antice multo angustiore, parte thoracica antice late depressa et longe pone oculos sulco brevi sed profundo impressa, oculis anticis in lineam recurvam, clypeo maris angustiore tantum ad marginem barbato, laminis maris extus tuberculatis. — Typus : *R. variegata* E. Simon.

includente, notata, thoracica utrinque subglabra, in medio pilis albidis longissimis munita. Pili oculorum albedo-lutei, supra oculos medios aurantiaci. Clypeus ad marginem pilis albidis longis paucis munitus. Abdomen ovatum, depressiusculum, nigrinum, obscure testaceo-variaturum, rufulo albidoque pubescens, in parte apicali arcubus sinuosis albidis ornatum, subtus olivaceum. Partes oris sternumque olivacea. Chelæ nigræ, glabræ, subtiliter transversim striatæ, marginibus sulci longis, dentibus mediocribus, remotis. Pedes antici robusti, nigricantes, coxis patellis tarsisque dilutioribus. Pedes postici lutei, late nigro-annulati, cuncti parce albidopilosi. Pedes-maxillares breves et robusti, nigri, femore ad apicem patellaque dilutioribus et crasse albedo-crinitis; femore brevi et robusto; tibia patella paulo brevior et angustior, apophysi fere inferiore subbasilari, crassa, nitida, curvata et semilunari extus armata; tarso magno late ovato; bulbo maximo, ad basin valde convexo et subrotundo, ad apicem oblique truncato et stylo valido curvato munito, sed abrupte angustior et turbinato. — Venezuela : Caracas!

Dasyceyptus (1) *dimus* sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, pilis depressis pronis viridi-micantibus vestitus. Pili oculorum pallide lutei, sub oculis mediis albi. Clypeus utrinque luteo in medio albo-barbatus. Oculi antici a sese subcontigui, apicibus in lineam recurvam. Oculi postici sat magni, ab oculis ser. 2^æ spatio oculo non multo latiore distantes. Abdomen breviter ovatum, supra crebre viridi roseoque micanti pilosum subsquamulatum sed utrinque macula magna subquadrata fusca et subglabra notatum, subtus simpliciter albo-pubescens. Chelæ mediocres, fusco-piceæ, læves, ad basin crebre albo-pilosæ, præterea glabræ, margine inferiore sulci dente valido et compresso armato. Pedes sat longi, nigricantes, coxis sex posticis, metatarsis tarsisque cunctis, femoribus posticis ad basin fulvo-rufulis, aculeis longis numerosis ordinariis armati. Pedes-maxillares robusti, fusco-picei; patella haud vel vix longior quam latior; tibia patella circiter æquilonga, superne leviter depressa, apophysi apicali brevi, lata, truncata et subquadrata, superne minute dentata, armata; tarso ovato, ad basin convexo, ad apicem attenuato, depresso, stylo valido et uncato armato. — Africa occid. : Gabon.

Viciria bombycina sp. nov. — Long. 7 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, rubro-pubescens, parte cephalica obscu-

(1) *Dasyceyptus* nov. gen. a *Colytto* differt pedibus 3ⁱ paris pedibus 4ⁱ paris vix longioribus, chelis maris debilibus, marginibus sulci brevibus, bulbo maris basi convexo et subgloboso, laminis extus obtusis. — Typus: *D. dimus* E. Simon.

riore, utrinque prope oculos nigra, macula frontali transversa maculaque media maxima triquetra albido-luteo-pilosis ornata, thoracica vitta marginali latissima sed postice interrupta albo-luteo-pilosa cincta. Pili oculorum læte rubro-coccinei. Clypeus pilis albis paucis tenuibus et longissimis vestitus. Abdomen angustum, supra fuscum, læte rubro-pilosum, parce et longe albo-crinitum et vitta media integra lata, sed postice sensim attenuata, albo-luteo-pilosa, ornatum, subtus nigrum utrinque albo-pilosum. Mamillæ inferiores nigræ, superiores fulvo-rufulæ. Chelæ nigro-nitidæ. Partes oris sternumque nigra, laminæ extus ad apicem dilatatæ rotundæ et convexæ. Pedes quatuor antici robusti nigri, femoribus utrinque patellisque supra castaneis, metatarsis gracilibus luteis ad basin minute nigris, tarsis ad basin luteis ad apicem nigris, femoribus subtus breviter nigro-fimbriatis et longissime albo-crinitis, tibiis subtus crebre et longissime supra brevius nigro-fimbriatis, metatarsis ad basin (in parte nigra) subtus nigro-crinitis, aculeis inferioribus longis 2-2 et intus, prope basin, aculeo laterali minore armatis. Pedes postici lutei, coxis femoribusque utrinque late nigro-vittatis, patellis fuscis, tibiis ad apicem late nigro-annulatis et subtus nigro-fimbriatis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusco-castanei, tarso ad basin rubro-piloso; tibia patella brevior, apophysi exteriore valida, attenuata sed obtusa, oblique divaricata et leviter curvata, intus minutissime serrulata, armata; tarso lato; bulbo simplici, disciformi et subrotundo, ad basin haud producto. — Borneo (ex Museo G. et E. Peckham).

V. formosa sp. nov. — Long. 7 mill. — Cephalothorax fulvus, parte cephalica rubro-castanea, maculis ocularibus nigris notata et coccineo-pilosa, utrinque, in declivitate et prope marginem, albido-luteo-pilosus, vitta media, antice lata, postice sensim acuminata, albido-luteo-pilosa, ornatus. Pili oculorum breves, albo rubroque mixti. Pili clypei albi, parum densi, tenues et longissimi. Abdomen angustum, supra fulvum, rubro-pilosum subsquamulatum et vitta integra albido-luteo-pilosa ornatum, subtus nigrinum. Chelæ nitidæ, nigro-æneæ, apice leviter rufulæ. Partes oris sternumque nigra, laminæ extus ad apicem dilatato-rotundæ et convexæ. Pedes lutei, antici reliquis robustiores, patellis tibisque fusco-castaneis, tibiis utrinque fere nigris, subtus longe et crebre supra brevius nigro-fimbriatis, metatarsis gracilibus haud fimbriatis, aculeis inferioribus longis 2-2 armatis, metatarso 2ⁱ paris aculeis lateralibus minoribus binis utrinque munito, tarso 1ⁱ paris intense nigro longe nigro-crinito. Pedes-maxillares sat graciles, lutei; tibia patella saltem æquilonga, versus basin sensim angustiore, apophysi apicali gracili obliqua et recta, apice nigra et oblique truncata, armata; tarso sat longo, tibia vix latiore; bulbo

simplici, subrotundo, intus stylo libero munito. — Java : Palabuan (Fruhstorfer).

A *V. semicoccinea* E. Sim., cui affinis est, imprimis differt, vitta media cephalothoracis pone oculos producta albido-lutea haud nivea, parte thoracica haud rubro-pilosa, femoribus anticis fulvis, tibiis 3ⁱ paris apice nec annulatis nec fimbriatis, pedibus-maxillari-bus luteis multo gracilioribus.

V. diatreta sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigra, crebre olivaceo-squamulata, ad marginem frontalem utrinque, supra oculos, longius pilosa et subcristata, macula frontali et utrinque, inter oculos, macula majore, niveo-squamulatis, ornata, parte thoracica antice dilutiore et albo-squamulata lineaque submarginali alba sat angusta et postice interrupta ornata. Pili oculorum albi. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, supra cervino-squamulatum sed vitta media integra et utrinque vitta marginali latiore niveo-squamulatis decoratum, subtus omniino albo-argenteo-squamulatum. Chelæ nigro-nitidæ, leviter striolato-rugosæ. Partes oris fuscæ. Sternum luteum, albo-pilosum. Pedes fulvi, albo-squamulati, haud fimbriati, femore 1ⁱ paris valde infuscato fere nigro, patella tibiaque apice leviter fusco-rufulis, metatarso sat longo, aculeis parum longis 2-2, basali interiore reliquis paulo robustiore, armato. Pedes-maxillares sat graciles, fulvo-rufuli, femore ad basin leviter infuscato; tibia patella brevior, apophysi apicali parva, acuta, simplici et antice directa extus armata; tarso tibia haud latiore, teretiusculo; bulbo angusto, ad basin oblique truncato, apicem versus sensim acuminato et stylo parvo apicali munito. — India merid. : Trichinopoly.

Spilargis (1) **ignicolor** sp. nov. — ♂. Long. 6,3 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, læte rubro-pubescens, area oculari subglabra, æneo-tincta. Pili oculorum rubri. Clypeus altissimus nudus sed, sub oculis mediis aculeis, setiformibus 2 vel 4 erectis instructus. Abdomen breve, fulvum, rubro-nitido-pubescens, maculis mediis binis subrotundis nigerrimis plagulaque apicali magna albo-pilosa decoratum, subtus obscure testaceum, confuse fusco-vittatum. Sternum obscure fulvum. Chelæ fusco-rufulæ, cyaneo-tinctæ, subtiliter coriaceæ. Pedes longi, fusco-rufescentes, tarsis cunctis metatarsisque posticis luteis, femoribus subtus tibiisque anticis fere nigris cyaneo-

(1) *Spilargis* nov. gen. ab *Eupalia* differt oculis ser. 2^e ab oculis lateralibus anticis et posticis æque remotis, clypeo nudo, maris setis spiniformibus instructo, pedibus posticis numerose aculeatis, metatarsis anticis aculeis inferioribus, lateralibus dorsalibusque munitis, abdomine brevi. — Typus : *S. ignicolor* E. Simon.

tinctis et parce rubro-pilosis; tibiis metatarsisque anticis subtus nigro-ciliatis. Pedes-maxillares albo-testacei tarso rufescenti; tibia patella fere duplo longiore, tereti, apophysi apicali nigra, parva, simplici et obtusa instructa; tarso parvo, tibia multo brevior vix angustior; bulbo parvo, ovato, stylo apicali brevi et curvato munito.

♀. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax flavidus, parte cephalica albo-opaca sed maculis ocularibus magnis nigerrimis utrinque marginata. Pili oculorum et clypei pauci albi. Abdomen latius ovatum, albo-opacum, antice maculis binis fuscis, prope medium maculis majoribus binis nigerrimis rotundis, dein macula transversa nigra ornatum. Sternum, pedes-maxillares, pedesque pallide flava. — Ins. Halmahera.

Epidelaxia (1) **albastellata** sp. nov. — Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, obscure rufo-pubescent, parte cephalica in medio late flavido-pilosa utrinque albo-variegata, ad marginem anticum longius rufo-pilosa subcristata atque in medio, inter oculos, fasciculo albo ornata, parte thoracica linea media exili vittaque marginali lata parce albo-pilosis, ornata. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus oculis mediis vix angustior, fere nudus. Abdomen oblongum, obscure testaceum, vitta media dilutior et albido-pilosa notatum, utrinque nigricanti-variegatum, fulvofulvo-pubescent et maculis binis parvis et obliquis niveo-pilosis ornatum, subtus parce albo-pilosum et linea media exili fusca notatum. Sternum fusco-olivaceum, in medio late dilutius. Chelæ longæ, fusco-purpureæ, antice deplanatæ, coriaceæ et valde transversim striatæ, subglabræ sed ad marginem anteriorem linea exili albido-pilosa notatæ, marginibus sulci longis, inferiore dente remoto æqualiter bifido armato. Pedes fulvi, confuse annulati, albido rufuloque pubescentes, tibiis metatarsis tarsisque 1ⁱ paris infuscatis. Pedes-maxillares graciles, pallide lutei, tarso apiceque tibiali infuscatis, femore supra longe albo-crinito; patella parallela plus duplo longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, paulo angustior, leviter depressa, supra et extus albido-pilosa, intus longe nigro-crinita, extus apophysi apicali nigra, acuta et infra oblique directa, armata; tarso longo et angusto, teretiusculo, intus, versus medium, longe nigro-fimbriato, bulbum multo superante; bulbo ovato, simplici, intus stylo longo sed subrecto marginato. — Ins. Taprobane : Colombo, Galle, Maturata!

E. albocruciata sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Præcedenti affinis. Cephalothorax niger vel fusco-piceus, obscure rufulo-pubes

(1) **Epidelaxia** nov. gen. ab *Husario* imprimis differt cephalothoracis parte cephalica inæquali et utrinque inter oculos depressa.

cens, parte cephalica parcissime albido-pilosa, nec cristata nec maculata, thoracica versus marginem albo-pilosa et linea media exili alba vel lutea, antice, inter oculos, arcuato-cruciata vel bifida, ornata. Pili oculorum supra oculos rubri subtus albi. Clypeus paulo angustior, parcissime albo-pilosus. Abdomen oblongum, obscure testaceum, vitta media dilutiore et albo-pilosa, postice plerumque ampliata, angulosa et transversim fusco-striata notatum, utrinque fusco-variegatum, rufulo luteoque pubescens et maculis albis parvis ornatum. Sternum fuscum. Pedes, chelæ et pedes-maxillares fere præcedentis sed metatarsis tarsisque 1ⁱ paris luteis apice late infuscat. — Ins. Taprobane : Colombo, Galle, Maturata !

E. obscura sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Præcedentibus affinis. Cephalothorax paulo latior et brevior, niger, obscure rufo-pubescens, parte thoracica linea media exili abbreviata albo-pilosa ornata. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus oculis mediis plus duplo angustior, nudus. Abdomen oblongum, fuscum vel nigricans, pilis albidis fulvisque vestitum et variegatum, subtus parce cinereo-pilosum. Chelæ, pedes-maxillares pedesque fere præcedentium, sed pedes-maxillares nigricantes, pedes obscuriores, antici fere omnino nigricantes. — Ins. Taprobane : Kandy !

Phausina (1) **flavofrenata** sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax sat angustus, niger, parte cephalica fulvo-aurantiaco pilosa, linea media confusa nigra notata, thoracica parcius rufulo-pilosa sed vitta marginali vittisque radiantibus longe albo-luteo-pilosis ornata. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus dimidio oculorum mediorum saltem haud angustior, ad marginem glaber, sub oculis vitta angusta, crasse flavido-barbata ornatus. Abdomen longe oblongum, fusco-testaceum, nigro-variegatum, nigro rufuloque pubescens, vitta marginali postice ampliata et antice linea media exili abbreviata albo-luteo-pilosis decoratum, subtus cinereo-pubescens. Chelæ fusco-castaneæ, fere glabræ. Pedes lutei, postici fusco-annulati, tibia antica aculeis inferioribus debilibus 3-1 aculeisque interioribus parvis trinis armata, metatarso tibia parum brevior, aculeis inferioribus 2-2 armato. Pedes-maxillares lutei, parce albido-pilosi, femore ad basin infuscat; tibia patella brevior, apophysi exteriori parva, nigra et uncata armata; tarso anguste ovato teretiusculo. — Ins. Taprobane mont. : Nuwara-Eliya, Maturata !

P. guttipes sp. nov. — ♂. Long. 4-5 mill. — Cephalothorax niger, pilis rufulis albidisque mixtis, versus marginem sensim albi-

(1) *Phausina* nov. gen. ab *Epidelaxia* differt clypeo sub oculis crebre barbato, ad marginem nudo, oculis anticis in lineam sat recurvam, tibiis posticis aculeo dorsali subbasali munitis. — Typus : *P. flavofrenata* E. Simon.

dioribus, vestitus. Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus rufuli. Clypeus dimidio oculorum mediorum haud latior fere glaber. Abdomen breviter ovatum, atrum, supra pilis rufulis albidisque mixtis vestitum, subtus cinereo-pubescent. Sternum nigrum. Chelæ nigro-nitidæ, glabræ, intus leviter depressæ. Pedes fulvo-rufuli, femoribus in medio atque ad apicem, præsertim in lateribus, late fusco-plagiatis et subannulatis, tibiis anticis utrinque fusco-variegatis et subvittatis, tibiis metatarsisque posticis valde fusco-annulatis, aculeis ut in præcedenti ordinatis. Pedes-maxillares castanei, crasse luteo-pilosi, femore nigro; tibia patella brevior, latiore quam longior, extus leviter angulosa atque apophysi parva et uncata armata; tarso angusto, teretiusculo; bulbo longe ovato, ad basin valde convexo obtuso et producto. — Ins. Taprobane: Maturata!

P. bivittata sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, obscure rufo-pubescent, lineis binis luteo-pilosis, ab angulis anticis ad marginem posticum ductis et postice sensim convergentibus ornatus. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus glaber. Abdomen oblongum, nigrum, supra obscure rufulo-pubescent, vitta marginali, utrinque, prope apicem interrupta et leviter incurva, lineaque media exili, medium parum superante, albido-pilosis, decoratum, subtus parcius et breviter albido-pubescent. Sternum chelæque nigro-nitida subglabra. Pedes obscure fulvo-rufescentes, femoribus anticis fere nigris, tibiis anticis utrinque infuscat, patellis, tibiis metatarsisque posticis fusco-annulatis, aculeis ut in præcedentibus ordinatis. Pedes-maxillares lutei femore nigro, femore ad apicem patellaque supra crasse albo-luteo-pilosis; tibia patella brevior, latiore quam longior, apophysi apicali parva et uncata extus armata; tarso sat angusto, teretiusculo; bulbo longe ovato, apice stylo brevi et recto munito, ad basin retro-producto et turbinato. — Ins. Taprobane: Colombo!

Semnolius (1) **chrysotrichus** sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax nigro æneus, subtiliter coriaceus (fere depilis), parce luteo-albido-pilosus. Pili oculorum supra oculos pallide lutei subtus albi. Clypeus fere nudus. Abdomen longum, atrum, supra crebre et longe flavo-nitido-subaureo-pubescent sed, ad marginem anticum sensim albidius, subtus parce et breviter albido-pilosum. Chelæ nigro-opacæ, antice planæ et latæ, valde et crebre transversim striolato-rugosæ, margine inferiore sulci carinula longa,

(1) *Semnolius* nov. gen. ab *Epidelaxia* imprimis differt parte thoracica antice plana postice declivi, sulco haud depresso munita. — Typus: *S. chrysotrichus* E. Simon.

utrinque truncata, haud dentata, munito. Partes oris sternumque nigro-nitida, laminæ extus sat longe et anguste productæ, sed truncatæ. Pedes antici nigricantes, metatarsis tarsisque castaneis. Reliqui pedes rubro-castanei, femoribus fere nigris, tarsis fulvis. Pedes-maxillares nigricantes; femore apice incrassato; patella saltem duplo longiore quam latiore; tibia patella brevior, apophysi apicali longa, sat gracili, recta et acuta, extus armata; tarso longo (patella cum tibia longiore), sat anguste ovato atque obtuso; bulbo magno, ovato, ad basin, sub tibia, longe retro-producto, leviter incrassato et subgloboso, ad apicem stylo recurvo munito. — Brasilia, prov. Minas : Caraça (E. Gounelle).

Encymachus (1) **Livingstonei** sp. nov. — ♂. Long. 9,5 mill. — Cephalothorax obscure rubro-castaneus, parte cephalica nigra, utrinque sub oculis setis validis nigris rigidis et curvatis ornata, pilis obscure rubris, antice pilis nitidis mixtis, vestitus, utrinque vitta submarginali albo-pilosa cinctus. Pili oculorum rubro-coccinei. Clypeus angustus glaber. Abdomen oblongum, postice attenuatum, atrum et leviter testaceo-variatur, longe et crebre fulvo-pubescent, supra linea media integra albidius-pilosa et rufulo-marginata, ornatum. Chelæ validæ et latæ, antice deplanatæ, valde et inordinatim striato-rugosæ, margine superiore sulci dentibus angularibus binis subgeminatis 1^o majore, inferiore dente remoto, sat longo, leviter curvato, apice oblique truncato, armatis. Partes oris fusco-castaneæ. Sternum obscure fulvum. Pedes quatuor antici nigricantes, metatarsis castaneis, tarsis fulvis, patella tibiaque 4ⁱ paris subtus crebre nigro-pilosis, metatarso tibia paulo brevior, aculeis sat brevibus 2-2 subtus armato. Pedes postici rufo-castanei, femoribus tibiisque apice valde infuscatis, numerose aculeati. Pedes-maxillares lutei, valde et longe albido-hirsuti, modice longi; tibia patella circiter æquilonga, apophysi apicali nigra, brevi, valida et incurva armata; tarso angusto, breviter ovato; bulbo rotundo, disciformi, stylo tenui circumdato. — Africa orient : Zambezi.

Nannenus (2) **syrphus** sp. nov. — ♂. Long. 3,5-4 mill. — Cephalothorax nigerrimus opacus, parte cephalica ad marginem anticum utrinque arcu transverso, postice utrinque, inter oculos, macula

(1) **Encymachus** nov. gen. a *Sennolio* differt pedibus 3ⁱ paris pedibus 4ⁱ paris paulo longioribus, metatarso aculeis apicalibus aculeis basilaribus quatuor aculeoque submedio armato, laminis maris extus rotundis, chelarum maris marginibus longis, inferiore dente remoto sat longo et truncato munito, bulbo disciformi haud producto. — Typus : *E. Livingstonei* E. Sim.

(2) **Nannenus** nov. gen. ab *Hasario* differt oculis anticis inter se subcontiguis, tibiis metatarsisque anticis aculeis longissimis subtus armatis, pedibus 3ⁱ paris pedibus 4ⁱ paris multo longioribus. — Typus : *N. syrphus* E. Sim.

obliqua, parte thoracica macula media subtriquetra vittaque submarginali, postice late interrupta, niveo-pilosis, decoratus. Pili oculorum pauci albidus. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem vitta crasse albo-barbata ornatus. Abdomen breve, antice truncatum, supra nigrum, lineis transversis exilibus subrectis maculaque parva apicali niveo-pilosis, ornatum, subtus fusco-testaceum. Mamillæ fusco testaceæ. Sternum nigro-nitidum. Chelæ longæ, usque ad basin valde divaricatæ et subtransversæ, nigro-opacæ, leviter attenuatæ, apice truncatæ cum angulo superiore leviter prominulo et granuloso, marginibus sulci longis, superiore dentibus parvis binis remotissimis, inferiore dente valido simplici et subacuto subapicali, denteque remotissimo subbasilari minore et truncato, armatis, ungue longissimo, ad basin curvato, dein subrecto et tereti, apice abrupte arcuato, cum angulo inferiore prominulo. Pedes quatuor antiqui nigri, coxis tarsisque fulvis, femoribus ad apicem, patellis tibiis metatarsisque in parte apicali macula niveo-pilosa supra ornatis. Pedes quatuor postici lutei, femoribus ad basin anguste fuscis ad apicem late nigro-annulatis, patellis tibiisque nigris supra macula albo-pilosa notatis, pedes 3ⁱ paris pedibus 4ⁱ paris multo longiores. Pedes-maxillares nigri, tarso apice luteo, femore ad apicem, patella tarsoque ad basin niveo-pilosis; patella circiter duplo longiore quam latiore; tibia brevior et angustior, apophysi apicali sat longa, leviter curvata et antice directa extus armata; tarso longo, ovato, apicem versus longe attenuato, leviter curvato, intus longe et crebre nigro-ciliato. — Singapore!

N. lyriger sp. nov. — ♂. Long 4. mill. — Cephalothorax obscure fusco-castaneus, parte cephalica nigra, fulvo-pubescente, utrinque, inter oculos, albo-pilosa, parte thoracica vitta marginali lata, albo-pilosa, postice interrupta, cincta. Pili oculorum fulvi, extus rufuli. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem longe albo-barbatus. Abdomen nigricans, testaceo-variatus (vitta media dentata maculas seriatas includente plerumque notatum), fulvo-pubescent et antice arcu lato albo-piloso cinctum. Sternum fuscum, læve. Chelæ fusco-rufulæ, sat latæ, divaricatæ, sublæves, antice prope medium, area subrotunda, striis transversis profundis quinque impressa, insigniter notatis, margine inferiore sulci dente submedio, attenuato, obliquo et apice truncato munito, ungue sat longo, arcuato, simplici. Pedes antiqui nigri, tarsis luteis albo-pilosis. Pedes postici fulvi, femoribus nigris, tibiis ad basin atque ad apicem late nigris annulatis. Pedes-maxillares fusco-castanei vel nigris, parce albo-pilosi; patella fere 1/3 longior quam latior; tibia patella brevior, apophysi apicali, antice directa, recta sat robusta atque obtusa, extus armata; tarso longo, sat late

ovato sed apice longe acuminato et leviter extus arcuato, intus nigro-fimbriato; bulbo longo, ad basin producto, valde convexo et globoso, apice depresso et subparallelo, intus stylo libero, valido et longo, apice tarso attingente, marginato. — Singapore!

Uxuma (1) impudica sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax obscure fusco-castaneus, parte cephalica nigra, fulvo-rufulo-pubescent, versus marginem, in declivitate, parce et longe albido-pilosus. Pili oculorum rufuli. Clypeus glaber, oculis mediis saltem $\frac{2}{3}$ angustior. Oculi laterales a mediis angustissime distantes. (Abdomen valde detritum). Sternum obscure fulvum. Chelæ nigro-æneæ, coriaceæ et transversim rugatæ, parce pilosæ. Pedes fulvo-rufuli, antici femoribus tibiisque infuscatis, postici confuse fusco-annulati, aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares sat breves et robusti, fusci, patella dilutior, femore ad apicem, patella tibiaque utrinque, tarsoque crasse et longe albido-luteo-crinitis; femore robusto, compresso et curvato; patella vix longiore quam latiore; tibia patella brevior, apophysi nigra, magna et divaricata (articulo longiore), compressa et subtus ad basin obtuse mucronata, armata; tarso sat late et breviter ovato; bulbo maximo, valde convexo et subgloboso. — Africa occid. : Gabon.

Curubis (2) erratica sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, obscure fulvo-rufulo-pubescent, parte cephalica utrinque macula parva et postice macula minutissima albo-pilosis notata, parte thoracica in medio atque ad marginem parce albo-pilosa. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, subtus longissimi albi. Clypeus sat angustus, crebre albido-barbatus. Abdomen breve, fuscum, fulvo-rufulo-pubescent, antice utrinque albidius pilosum, pone medium macula maxima transverso-arcuata albidior sed lineam fuscam arcuatam includente, notatum, subtus atrum, parce cinereo-pubescent. Sternum fusco-olivaceum, læve, longe albo-crinatum. Chelæ sat breves, fusco-rufulæ, ad basin atque ad marginem anteriorem crasse et longe albido-crinatæ. Pedes antici fusco-olivacei, patellis metatarsis tarsisque dilutioribus, breves et robusti, tibia 1^a paris patella haud longiore, subtus ad marginem anteriorem aculeis debilibus binis uniseriatis aculeoque laterali interiore

(1) *Uxuma* nov. gen. a *Nanneno* differt stria thoracica parva, evidenter pone oculos posticos sita, clypeo nudo, tibiis quatuor posticis aculeo dorsali subbasilari munitis. — Typus : *U. impudica* E. Simon.

(2) *Curubis* nov. gen. ab *Hasario* differt oculis anticis in lineam valde recurvam, pedibus anticis brevibus, tibia patella vix longiore aculeis exterioribus debilibus trinis aculeoque interiore parvo subapicali armata, metatarso tarso haud longiore, aculeis longis 2-2 subtus munito, clypeo omnino crebre barbato. — Typus : *C. erratica* E. Simon.

subapicali armata, metatarso tarso haud longiore aculeis validioribus et longioribus 2-2 subtus munito. Pedes postici lutei, valde nigricanti-annulati. Pedes-maxillares breves et robusti, femore ad basin, tibia tarsoque subnigris, femore patellaque supra crasse albido-pilosis, tibia basique tarsi flavido-hirsutis; tibia brevi, intus longissime fasciculata, extus, apophysi longa (medium bulbi fere attingente) valde arcuata armata; tarso ovato; bulbo magno, ad basin convexo. — Ins. Taprobane : Galle!

C. annulata sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, pilis pronis obscure rufis albidisque mixtis vestitus, vitta media (medium partis cephalicæ antice haud superante) albido-pilosa, ornatus. Oculi antiqui glauci. Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albi. Clypeus sat angustus, crebre et longe albido-barbatus. Abdomen breve, nigrum, supra pilis rufulis albidisque mixtis vestitum, ad marginem anticum albidius, postice utrinque macula obliqua confusa albidius-pilosa notatum, subtus albo-pubescent. Sternum nigrum albo-pilosum. Chelæ fuscae, apice dilutiores et rufulæ, valde rugosæ, ad basin et extus valde et longe albido-crinitæ. Pedes fere præcedentis, fulvo-olivacei, fusco-annulati. Pedes-maxillares breves et robusti, lutei, femore subtus fusco-vittato, tibia tarsoque nigricantibus, femore patellaque supra, tibia intus crebre et longe albido-crinitis; bulbo magno, valde convexo. — Ins. Taprobane : Kandy!

C. tetrica sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — A *C. erratica* differt oculis anticis in lineam minus recurvam, cephalothorace nigro, pilis pronis fulvo-nitidis omnino vestito, pilis oculorum rufulis, clypeo sat angusto crebre flavido-barbato, abdomine breviter ovato, nigro, supra fulvo-nitido (ad marginem anticum dilutius) subtus parcius cinereo-pubescenti. — Chelæ breves, fusco-rufulæ, antice rugatæ atque ad basin crasse et longe flavido-crinitæ. Pedes nigricantes, antiqui patellis metatarsis tarsisque dilutioribus, postici coxis trochanteribus tarsisque luteis, patellis ad basin, tibis metatarsisque in medio late luteo-annulatis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusco-castanei, femore tarsoque nigris, femore patella tibiaque intus crasse et longe flavido-pilosis; tibia brevi, apophysi exteriori longa et recta, secundum tarsum antice recte directâ, instructa. — Ins. Taprobane : Galle!

Nebridia (1) **semicana** sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax longus, niger, supra pilis crassis pronis, antice incurvis,

(1) *Nebridia* nov. gen. a *Curubi* differt clypeo angustissimo, ad marginem pilis paucis uniseriatis tantum munito, tibia antica aculeis 3-3 subtus munita. — Typus : *N. semicana* E. Simon.

albidis, vittam latissimam, postice attenuatam, formantibus et macula media frontali, subrotunda fulvo-rufula, ornatus, utrinque fulvo-rufulo-pilosus sed versus marginem fere glaber. Pili oculorum albedo-flavidi. Clypeus angustus, ad marginem setis albidis longis, incurvis et uniseriatis munitus. Abdomen oblongum, atrum, postice macula magna angulosa dilutior, arcus parvos binos includente, notatum, albedo fulvoque pubescens et in parte basali vittis duabus latis crasse niveo-pilosis subsquamulatis, ornatum. Chelæ debiles, breves et verticales, fulvo-rufulæ, antice leviter coriaceæ et subtiliter rugatæ; margine inferiore sulci carinula trifida munito. Sternum nigro-nitidum. Pedes quatuor antiqui fusco-olivacei, tibiis subtus dilutioribus, tarsis luteis. Pedes quatuor postici lutei, late et valde nigro-annulati. Pedes-maxillares breves et robusti, fusci, tarso excepto, supra crasse albo-hirsuti; femore curvato subtus apice convexo; tibia patella brevior, apophysi exteriori magna, oblique divaricata, apice ampliata truncata et valde bifida, ramulo superiore erecto longo et acuto, inferiore brevior sed acuto; tarso ovato; bulbo magno et convexo, postice longe attenuato et retro producto, antice, in declivitate, stylo longe procurvo munito. — Venezuela : Colonia Tovar!

Tarne dives E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 392. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, lævis (omnino depilis). Pili oculorum albi. Pili clypei albi longissimi et uniseriati. Abdomen atrum squamulis parvis viridi-aureo-nitidis supra omnino vestitum, subtus parcius albedo-pilosum. Sternum nigrum, albedo-pilosum. Chelæ nigrae, parallelæ, antice valde rugoso-striatæ et prope basin parce albo-crinitæ, marginibus sulci brevissimis, inferiore carinula parva fere æqualiter bidentata ad radicem unguis vix discreta, munito. Pedes antiqui nigri, leviter cyaneo-tincti, coxis metatarsis tarsisque luteis, femoribus 2ⁱ paris versus basin dilutioribus, metatarsis ad basin atque ad apicem minute nigris. Pedes postici lutei, femoribus tibiisque ad apicem infuscatis. Pedes-maxillares fusco-testacei, robusti; patella haud duplo longior quam latior; tibia brevior supra apophysi apicali longa, gracili sed depressa et obtusa intus leviter oblique directa, armata; tarso longo, sat angusto et curvato; bulbo magno rhomboidali, ad basin atque ad apicem attenuato, apice leviter incurvo et truncato, intus stylo libero longissimo, ad basin sat valido et compresso, dein tenui et leviter flexuoso, apicem tarsi attingente, laminaque libera paulo brevior robustior, valde compressa et subrecta sed apice minute uncata, insigniter munito.

♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger (fere omnino depilis). Pili oculorum pallide flavidi. Clypeus angustus, fulvus, ad marginem setis paucis longis uniseriatis munitus. Abdomen oblongum,

supra fuscum, squamulis parvis viridi-aureis nitidis omnino obtectum, subtus fulvo-testaceum, parce et simpliciter albido-pilosum. Mamillæ fuscæ, apice testaceæ. Chelæ breves et latæ, extus convexæ, antice deplanatæ et grosse transversim rugatæ, nigro-nitidæ. Partes oris sternumque fusco-picea. Pedes antici fusco-ravidi, coxis metatarsis tarsisque dilutioribus, postici fulvi. Area genitalis antice fovea subrotunda, postice plagula rufula linguiformi munita. — Africa occidentalis : Assinia, Ogoue, Congo.

Mopiopia (1) comatala sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica dilutiore sed utrinque prope oculos late nigra et lineolis fuscis abbreviatis in medio notata, fulvo-rufulo-pubescentem et arcu lato albidius piloso ornatus. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus angustus fere glaber. Abdomen fulvo-testaceum, parcissime fusco punctatum et prope medium arcubus transversis fuscis binis notatum, fulvo-pubescentem, antice vitta arcuata albidius-pilosa cinctum, subtus fusco-variaturum et albido-pilosum. Sternum fuscum. Chelæ nigricantes, ad basin convexæ ad apicem leviter depressæ, attenuatæ et valde divaricatæ, supra radicem unguis processu parvo et obtuso et subtus processu simili munitæ, marginibus sulci valde excavatis, superiore dentibus angularibus binis, 1° majore, inferiore dente longissimo sat gracili, obliquo et leviter arcuato, postice ad basin minute dentato, instructis, ungue longo ad basin valde inflato et subgloboso. Pedes antici nigricantes, tarso luteo, metatarso leviter depresso, subtus aculeis longis 2-2, apicali interiore divaricata et curvata, aculeisque apicalibus binis minutissimis armato. Reliqui pedes fulvo-rufuli, femoribus nigricantibus, tibiis versus apicem late infuscatis, metatarsis tarsisque luteis, his apice fusco-annulatis. Pedes-maxillares fusco-rufescentes; tibia patella brevior, apophysi gracili longa, recta et antice directa armata; tarso longo; bulbo longe fusiformi, ad basin attenuato et producto ad apicem stylo tenui, circulum formante, munito.

♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax obscure fulvus, postice et versus marginem valde infuscatus, maculis ocularibus latis nigris notatus, longe albido fulvoque pubescens. Pili oculorum supra oculos fulvi subtus albi. Clypeus ad marginem setis albis longis paucis et uniseriatis munitus. Abdomen cinereo-testaceum albido fulvoque pubescens, parce fusco-punctatum, antice vitta longitudinali, postice muculis uniseriatis, transversim triquetris fuscis supra notatum, subtus subtiliter et parce fusco-variaturum. Chelæ

(1) **Mopiopia** nov. gen. a *Panysino* differt quadrangulo oculorum parallelo, metatarsis anticis aculeis lateralibus inferioribus multo minoribus, chelis maris longis, angustis et incurvis. — Typus : *M. comatula* E. Simon.

fuscae, laeves, margine inferiore sulci carinula valde bidentata armato. Sternum fusco-olivaceum. Pedes lutei, fusco-annulati, femore 1ⁱ paris nigricanti. Plaga genitalis latior quam longior, fere semicircularis, utrinque area magna subrotunda, in medio obtuse tuberculata, notata. — Brasilia merid. : Prov. S. Paulo.

Marma (1) **Baeri** sp. nov. — ♂. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax niger, pilis longis pronis, in parte cephalica incurvis, luteis rufulisque paucis intermixtis supra dense, versus marginem parce vestitus. Pili oculorum intus pallide fulvi, extus fulvo-aurantiaci. Clypeus dimidio oculorum mediorum paulo latior, depressus et fere glaber. Abdomen breve, fusco-testaceum, superne pilis luteis rufulisque mixtis crebre vestitum et postice arcubus angulosis obscurioribus vix expressis notatum, subtus albedo-pubescens. Sternum fusco-olivaceum, laeve, albo-pilosum. Chelae longae, angustae, apice attenuatae, nigricantes, valde transversim striatae, margine superiore sulci dentibus binis subcontiguis, inferiore carinula brevi bifida, dente 2^o 1^o majore, armatis. Pedes lutei, vix distincte olivaceo-variati, tarsis anticis obscurioribus fere nigris. Pedes 1ⁱ paris reliquis longiores, trochantero patella et praesertim metatarso (gracili) longis. Pedes-maxillares sat robusti, lutei, femore ad basin tarsoque fuscis, patella tibiaque supra, praesertim intus, tarso extus, crasse et longe albo-luteo-pilosis; patella vix longiore quam latiore; tibia patella brevior et angustior, apophysi apicali sat gracili et acuta, antice directa et leviter incurva extus armata; tarso longo et angusto; bulbo magno, ad basin convexo, subrotundo et foveolato, ad apicem attenuato et fisso.

♀. Long. 5 mill. — A mari differt pedibus anticis brevioribus, tarsis haud infuscatis, pedibus-maxillaribus luteis, albedo-pilosis, chelis brevioribus, fulvis, margine inferiore sulci carinula semicirculari acute trifida armato. Plaga genitalis fulvo-rufula, magna, antice depressa et utrinque minute foveolata, postice convexa et ovato-transversa. — Ecuador sept. : Tumbez (G. A. Baer).

Donoessus (2) **striatus** sp. nov. — ♂. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax (fere omnino depilis) fusco-rufescens, parte cephalica nigra, utrinque inter oculos et parte thoracica antice albo-pilosis. Pili oculorum albidii. Clypeus pilis albis longis paucis uniseriatis munitus. Abdomen sat breve, postice attenuatum, obscure fulvo-testaceum antice infuscatum, in medio et postice lineis trans-

(1) **Marma** nov. gen. a *Tarna* differt tegumentis simpliciter pilosis, oculis anticis apicibus in lineam valde recurvam. Typus : *M. Baeri* E. Simon.

(2) **Donoessus** nov. gen. ab *Hasario* differt cephalothorace crassiore fere *Pseudamyci*, parte cephalica tuberculata et impressa, metatarsis anticis aculeis inferioribus lateralibusque instructis. — Typus : *D. (Hasarius) nigriceps* E. Simon.

versis obscurioribus segmentatum, albido fulvoque pubescens, sub-
tus fusco-testaceum. Chelæ sat breves et latæ, antice deplanatæ,
valde et regulariter transversim striatæ, intus, prope basin con-
vexæ, margine superiore sulci dentibus geminatis binis, 1° multo
majore, inferiore dente longo compresso inæqualiter fisso (ramulo
antere minutissimo et acuto, posteriore multo crassiore, lon-
giore atque obtuso). Partes oris fusco-castaneæ, laminæ sat longæ,
extus angulosæ haud dentatæ. Sternum coxæque fusco-olivacea.
Pedes quatuor antici fusco-castanei, femoribus subtus tibiisque fere
nigris, tarsis luteis. Pedes quatuor postici fulvi, femoribus, præ-
sertim 2ⁱ paris apice late fuscis, patellis tibiisque utrinque infus-
catis et subvittatis, metatarsis quatuor anticis aculeis inferioribus
longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis armatis, tibiis quatuor
posticis aculeo parvo dorsali subbasilari munitis. Pedes-maxillares
sat breves et graciles, fulvi, fusco-variati; tibia patella circiter æqui-
longa, apophysi apicali gracili et recta, apice minutissime uncata,
antice oblique directa, extus armata; tarso angusto; bulbo longo,
fusiformi, ad basin retro producto atque obtuso. — Borneo (ex Mus.
G. et E. Peckham).

Chalcotropis (1) **acute frenatus** sp. nov. — ♂. Long. 10 mill.
— Cephalothorax crassus, utrinque ample rotundus, lævis, fusco-
piceus, tuberibus ocularibus late nigris, parte cephalica utrinque
sub oculis vitta sinuosa et postice macula subtriquetra albo-pilosis
decorata, thoracica vitta marginali carente. Pili oculorum fulvi.
Clypeus glaber, oculis mediis plus duplo angustior. Abdomen
angustum, postice acuminatum, supra obscure fulvum nigricanti-
punctatum et postice transversim striatum, sed crebre olivaceo-
pubescens et utrinque confuse albido-marginatum, subtus utrinque
albido-pilosum, vitta latissima nigra notatum. Chelæ castaneo-
micantes, latissimæ et divaricatæ, extus ample rotundæ et carinatæ,
antice planæ sed in medio plica vel carina integra extus ad mar-
ginem acute dentata, oblique sectæ, margine superiore sulci dente
remotissimo obtuso, margine inferiore carinato et depresso, dente
apicali sat gracili, leviter curvato, denteque remotissimo inæqualiter
fisso (ramulo 1° 2° majore) insigniter armatis, ungue longissimo,
sinuoso, in parte basali crasso et subtus convexo, in parte apicali
compresso et arcuato. Sternum fusco-castaneum. Pedes nigricantes,
coxis tarsisque paulo dilutioribus, tibiis anticis subtus sat crebre
sed breviter nigro-ciliatis, metatarsis tibiis non multo brevioribus,

(1) **Chalcotropis** nov. gen. a *Donoesso* differt metatarsis anticis aculeis
lateralibus binis uniseriatis utrinque munitis, quadrangulo oculorum parallelo,
oculis posticis lateralibus anticis paulo minoribus. — Typus : *C. acute frenatus*
E. Sim.

aculeis inferioribus longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis, apicali minore, armatis. Pedes-maxillares graciles et longi; femore valde curvato; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia patella longiore, graciliore et tereti, apophysi apicali simplici acuta et recta extus armata; tarso tibia paulo brevior, non multo latiore, apice parum attenuato atque obtuso; bulbo simplici, disciformi, stylo tenui subrecto munito. — Java: Palabuan (Fruhstorfer).

C. præclarus sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigra leviter æneo-tincta (supra fere depilis), utrinque vitta submarginali latissima albido-luteo-pilosa, ornatus. Pili oculorum supra oculos albido-lutei, subtus fulvi. Clypeus oculis mediis plus duplo angustior, glaber. Abdomen ovatum, supra atrum, olivaceo-nitido-pubescent subsquamulatum, antice arcu transverso albidior, postice maculis binis obscurioribus notatum, subtus nigrum et subglabrum sed utrinque vitta albo-pilosa marginatum. Mamillæ superiores nigræ linea albo-pilosa ornatae, reliquæ fulvæ. Chelæ æneo-nitidæ, leviter coriaceæ sed nitidæ, latæ et divaricatae, extus ample rotundæ, antice planæ sed plica vel carina oblique sectæ, margine superiore sulci dentibus binis inter se subæquis, inferiore dente compresso inæqualiter fisso (ramulo apicali altero majore) et prope radicem unguis tuberculo parvo et obtuso armatis, ungue simplici, longo et arcuato. Partes oris nigro-castaneæ, ad marginem dilutiores. Sternum fulvum. Pedes antici fusco-castanei, postici dilutiores, coxis, femoribus ad basin metatarsis tarsisque fulvis, ut in præcedenti aculeati. Pedes-maxillares fuscii, tibia ad apicem tarsoque dilutioribus et albo-pilosis, fere ut in præcedenti sed paulo breviores — Ins. Luzonia: Manila, Quingua!

C. pennatus sp. nov. — ♂. Long. 8-9 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica nigro-nitida sæpe in medio dilutior et subvittata, antice fulvo-rufulo, utrinque in declivitate et inter oculos, albo-pilosa, thoracica versus marginem sensim obscurior, interdum fusco-marginata, macula vel vitta media albido-pilosa ornata. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, subtus albi. Clypeus sub oculis glaber, ad marginem pilis albis longis, crebre uniseriatis, ornatus. Abdomen longum, supra fuscum, fulvo-nitido-pubescent, vitta media dilutior et albido-pilosa, confuse nigricanti-marginata, in parte basali parallela, in parte altera profunde et acute pennata ornatum, subtus vitta media nigra lata, postice sensim attenuata et mamillas haud attingente, notatum. Chelæ latissimæ, æneo-nitidæ, apice et intus rufulæ, extus valde convexæ, intus ad basin carinatae, valde transversim sinuoso-striolatae sed area basali nitidior ornatae, marginibus sulci longis, superiore ad

angulum dentibus prominulis binis geminatis et inter se valde iniquis, inferiore dente obliquo leviter curvato, apice attenuato, minute et obtuse fisso, instructis. Partes oris castaneæ, laminæ extus turbinateæ. Sternum fulvum. Pedes 1ⁱ paris castanei, femore nigro subtus late olivaceo-vittato, tibia metatarsoque ad apicem nigricantibus, metatarso ad basin tarsoque pallide luteis. Reliqui pedes lutei vel fulvi, femoribus ad apicem, præsertim subtus, late fusco nigrove annulatis, aculeis ut in præcedenti ordinatis sed metatarsis 4ⁱ paris verticillo basali ex aculeis quatuor tantum composito. Pedes maxillares fulvo-castanei, graciles, sat longi; tibia patella fere æquilonga, apophysi apicali sat longa gracili et recta sed apice minutissime uncata armata; tarso anguste ovato; bulbo longo, ad basin valde attenuato et subacute producto, ad apicem area rufula subrotunda, stylo tenui marginata et spinam nigram sat fortem emittente, munito. — India merid. : Madura.

C. radiatus sp. nov. — ♂. Long. 12 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica castanea, prope oculos fere nigra, fulvo-rufulo-pubescenti, utrinque in declivitate et inter oculos albo pilosa, thoracica versus marginem sensim obscuriore, in medio albo-pilosa, dein lineolis radiantibus albo pilosis ornata. Pili oculorum supra oculos fulvo rufuli, subtus albi. Clypeus angustus, ad marginem pilis albis longis uniseriatis munitus. Abdomen longum, fusco-testaceum, supra fulvo-nitido-pubescenti et vitta media lata et integra albo-pilosa ornatum, subtus fere glabrum. Chelæ latissimæ sed apice attenuatæ et leviter divaricatæ, extus valde convexæ, intus in parte basali carinatæ, antice æneæ, saltem in parte apicali valde et sinuoso-striolatæ sed intus ad basin area ovata speculiformi lævi et nitidissima ornata, marginibus sulci sat longis, superiore dentibus binis, 1^o majore, inferiore carinula obliqua sat alta apice truncata cum angulis binis minute et acute dentatis, ungue valido et curvato. Partes oris castaneæ. Sternum obscure fulvum. Pedes 1ⁱ paris nigricantes, coxa patella supra tarsoque dilutioribus, tibia subtus crebre nigro-pilosa, metatarso tibia brevior, leviter curvato, aculeis inferioribus longis 2·2 et utrinque aculeis lateralibus binis, basali inferiore simili, apicali minore, instructa. Reliqui pedes rubro-castanei, coxis, femoribus subtus tarsisque dilutioribus, valde aculeati. Pedes-maxillares fusco-castanei, graciles et longi; femore curvato; tibia patella longior, tereti, apophysi apicali nigra sat longa, gracili, apice minutissime uncata et intus, prope medium, leviter convexa, extus armata; tarso anguste ovato, tibia brevior; bulbo ovato, ad basin attenuato sed vix producto, ad apicem area rufula coriacea subrotunda, stylo tenui marginata et spina media nigra

antice directa armata, munito. — Celebes : Bua Kraeng (Fruhstorfer).

C. decemstriatus sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica prope oculos nigra, thoracica antice area dilutiore notata, fulvo-olivaceo-pubescens, maculis frontalibus magnis trinis, macula media rhomboidali, pone oculos sita, et utrinque vitta submarginali, niveo-pilosis, structe decoratus. Pili oculorum albi. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem parce albo-barbatus. Abdomen breviter oblongum, supra atrum et leviter testaceo-variatum, antice vitta transversa lata et pone medium vittis transversis binis angustioribus niveo-pilosis ornatum, subtus fulvo-testaceum. Chelæ breves et verticales, sed latæ et subquadratae, antice deplanatae, æneae, in parte basali fere laeves, in parte altera striis profundis 9-10 transversim impressae, apice intus paululum depressae et rufulae, marginibus sulci sat longis, superiore dentibus angularibus binis subgeminatis, inferiore carinula emarginata et fere æqualiter bidentata, munitis, ungue valido, curvato, apice compresso. Partes oris fuscae. Sternum pedesque fulva, femoribus infuscatis, cunctis annulo apicali parvo, posticis annulo medio lato, fulvis et niveo-pilosis decoratis, tibia antica haud ciliata, metatarso tibia vix brevior, recto, aculeis inferioribus longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis, basali inferiore simili, apicali multo minore, instructo. Pedes-maxillares fulvi, modice longi, sat robusti; femore valido curvato; patella circiter æque longa ac lata; tibia patella fere æquilonga, paulo graciliore, apophysi nigra, compressa, acuta, antice directa et apice minutissime uncata, armata; tarso ovato, apice longe attenuato, tibia cum patella longiore; bulbo ovato, ad basin attenuato et breviter producto, apice stylo tenui, circulum formante et spina nigra, valida et recta, munito. — Ins. Luzonia : Antipolo!

Coryphasia (1) *albibarbis* sp. nov. — ♂. Long. 9 mill. — Cephalothorax fere laevis, castaneus, parte cephalica utrinque, prope oculos, thoracica versus marginem fere nigris, fulvo-pubescens, vitta media lata, antice posticeque abbreviata, paulo dilutiore et albido-pilosa notatus. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli subtus albi. Pili clypei albi densi, ad marginem longiores. Abdomen oblongum, obscure fulvum, supra flavo-nitido-pubescens, antice arcu angusto albo marginatum, prope medium maculis parvis fuscis binis subtri-

(1) *Coryphasia* nov. gen. a *Donoesso* differt metatarsis quatuor posticis verticillo basali ex aculeis quatuor (lateralibus 2 inferioribus 2), clypeo angusto longe seriatim barbato, laminis maris extus dilatatis et tuberculo parvo recurvo munitis, chelis maris validis extus convexis. — Typus : *C. albibarbis* E. Simon.

quetris, postice maculis fuscis minutissimis obliquis fuscis biseriatis notatum, subtus parcellissime fusco-punctatum. Sternum et partes oris fusco-testacea. Chelæ robustissimæ et convexæ, sed intus depressæ, nigro-æneæ, valde coriaceo-vermiculatæ. Pedes robusti et longi, fulvi, antici, femoribus exceptis, valde infuscati, postici metatarsis confuse annulatis. Pedes-maxillares parum longi, fusco-rufuli, nigro-pilosi; patella paulo longiore quam latiore; tibia brevior et angustior extus paululum emarginata, apophysi apicali simplici, depressa, gracili sed obtusa, armata; tarso sat angusto vix attenuato; bulbo longo, ad basin longe retro producto et cylindrato, ad apicem stylo, circulum minutum formante, munito.

♀. Long. 9-10 mill. — Cephalothorax fere maris sed vitta marginali sinuosa albido-pilosa notatus. Abdomen longius oblongum, obscure fulvum, fusco-punctatum, supra vitta longitudinali lata, apicem versus dentata et confuse fusco-marginata notatum. Chelæ breviores, convexæ, nigræ, sublæves. Pedes breviores, distinctius fusco-annulati. Plaga genitalis magna, antice lobis binis obliquis carinula tenui sejunctis, postice plagula nitida transversa, antice acute producta, notata. — Brasilia: Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

C. furcata sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos late niger, subtilissime coriaceus, parte cephalica utrinque albo-luteo-pilosa, thoracica utrinque vitta submarginali latissima arcuata, atque in medio macula magna ovata albido-luteo-pilosis ornata. Pili oculorum supra et inter oculos læte coccinei, subtus albi. Clypeus sub oculis pilis sat brevibus densis, vittam designantibus, ad marginem pilis multo longioribus, densis cunctis albis, valde barbatus. Abdomen luteo-testaceum, supra vittis duabus longitudinalibus flexuosis posticeque arcubus parvis fuscis notatum sed crebre luteo-albido-pubescens, subtus concolor et fere glabrum. Chelæ validæ, convexæ, haud carinatæ, antice fere glabræ, nigro æneæ, valde transversim rugatæ, margine superiore sulci longo, dentibus remotis binis geminatis munito, inferiore carinula longa, truncata, angulo anteriore leviter prominulo et minute fisso, posteriore acute dentato, ungue longo, inæquali, intus, prope medium, dente vel ramulo armato. Partes oris castaneæ, laminæ extus dilatatæ et mucronatæ. Sternum luteum. Pedes 1ⁱ paris reliquis robustiores fusco-castanei, metatarso basi excepto luteo, patella tibiaque subtus crebre nigro-pilosis, metatarso longo, aculeis inferioribus validis et longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis, apicali minore, armato. Reliqui pedes fulvo-rufuli, aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares sat robusti, pallide lutei, albo-hirsuti; tibia patella brevior, extus ad apicem apophysi gracili, recta et antice directa, instructa; tarso sat angusto;

bulbo longo ad basin longe retro producto, ampliato et subgloboso, ad apicem stylo recurvo, circulum formante, munito. — Brasilia, prov. Bahia : r. Salobro (E. Gounelle).

Ocnotelus (1) *imberbis* sp. nov. — ♂. Long. 8-10 mill. — Cephalothorax fuscus, parte cephalica nigra, thoracica vitta media fulva notata, subtilissime coriaceus, pilis flavidis longis vestitus. Pili oculorum pauci flavo-aurantiaci, sub oculos flavi. Clypeus fere nudus. Abdomen ovatum, obscure fulvo-testaceum, supra confuse infuscatum et vitta media dilutiore notatum, omnino flavido-pubescent, subtus testaceum et parcissime fusco-punctatum. Sternum olivaceum. Chelæ validæ et longæ, subparallelæ, antice deplanatæ, intus carinatæ et leviter emarginatæ, nigræ, valde transversim striatæ. Pedes longi et robusti, fulvi et flavido-pilosi, metatarsis posticis fusco-annulatis, tibiis quatuor anticis aculeis lateralibus carentibus. Pedes-maxillares obscure fulvi, mediocres; patella parallela, paulo longiore quam latiore; tibia brevior et angustior, apophysi apicali simplici, gracili et recta, extus armata; tarso minuto, longo, apicem versus attenuato; bulbo longo, ad basin attenuato et retro producto, ad apicem stylo, circulum minutum formante, munito. — Brasilia, prov. Minas : Caraça (E. Gounelle).

Commoris (2) *enoplognatha* sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, rubro-pubescent, parte cephalica æneo-tincta, prope oculos late nigra, thoracica vitta media vittaque marginali dilutioribus et albido-pilosis ornata. Pili oculorum supra oculos aurantiaci subtus breves albidii. Clypeus angustus fere nudus. Abdomen (valde detritum) angustum, supra fusco-testaceum, nigricanti-variatur, pilis rufulis albidisque mixtis nitidis vestitum, subtus fulvo-testaceum, vitta media lata obscuriore notatum. Partes oris nigro-olivaceæ. Sternum pedesque fulva, tarsis luteis, pedes antiqui reliquis robustiores, femoribus crassis subtus infuscatis, patellis tibiisque subtus sat crebre nigro-pilosis. Reliqui pedes femoribus subtus ad apicem patellis tibiisque confuse annulatis. Chelæ nitidæ sed valde coriaceæ, fusco-æneæ, apice rufescentes, latæ, antice deplanatæ, extus ampliatæ atque usque ad basin cari-

(1) *Ocnotelus* nov. gen. a *Coryphasia* differt metatarsis tibiisque anticis aculeis lateralibus exterioribus carentibus, aculeis lateralibus interioribus parvis munitis, laminis maris extus longe turbinatis, chelis maris longis, angustis et incurvis. — Typus : *O. imberbis* E. Simon.

(2) *Commoris* nov. gen. a *Coryphasia* differt metatarsis anticis utrinque aculeis lateralibus binis inter se valde iniquis, basali valido et longo, apicali minutissimo, armatis, clypeo angusto fere nudo, laminis maris extus obtusis, chelis maris latioribus, extus dilatatis et carinatis. — Typus : *C. enoplognatha* E. Simon.

natae, marginibus sulci longis, depressis et carinatis, superiore, prope radicem unguis, dente humili lato compresso sed acuto dentibusque angularibus binis remotis sed inter se contiguis et valde iniquis, 1° multo majore, margine inferiore, prope apicem, dente (vel apophysi) obtusa, carinulaque remota, inæqualiter bidentata, dente 1° (apicali) altero majore, instructis, ungue valido et longo, in medio leviter incrassato et subtus tuberculo obtuso munito. Pedes-maxillares fulvo-olivacei, albido-pilosi, sat longi et graciles; femore longo curvato; tibia patella circiter æquilonga et paulo graciliore, plus duplo longiore quam latiore, apophysi apicali tenui, acuta et curvata munita; tarso anguste ovato; bulbo parvo, fusiformi, ad basin atque ad apicem attenuato, stylo apicali, circulum parvum formante, munito. — Antillæ : Ins. Guadalupe.

Tariona (1) *Gounellei* sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra, fulvo-rufulo-pilosa, thoracica antice paulo dilutior et macula magna, ovato transversa, albido flavidoque pilosa ornata. Pili oculorum supra oculos aurantiaci, subtus albi. Clypeus angustus, fulvus, setis paucis albis longis et uniseriatis ad marginem munitus. Abdomen supra fuscum, postice dilutius et testaceum, antice arcu lato albo-piloso, dein punctis parvis binis, prope medium vitta transversa abbreviata recurva et utrinque maculis parvis et obliquis binis sordide albo-pilosis, notatum, subtus atrum utrinque testaceo-marginatum. Sternum fulvo-olivaceum. Chelæ rufulæ, coriaceæ, breves et latæ, antice deplanatæ atque ad marginem exteriorem, pone medium, tuberculo rotundo munitæ, margine superiore sulci obtuse et minute tuberculato, dentibusque angularibus binis geminatis munito, inferiore carinula longa, humili, haud emarginata sed minute serrulata munito. Pedes 1ⁱ paris fusco-rufuli, tarso luteo, reliqui pedes paulo dilutiores, coxis femoribus ad basin, metatarsis tarsisque luteis sed metatarsis ad basin atque ad apicem minute fuscis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusco-rufescentes, parce nigro-setosi; patella vix longiore quam latiore; tibia patella brevior, apophysi apicali gracili, recta et acuta extus armata; tarso ovato; bulbo longo ad basin producto et attenuato, stylo apicali minutissimo, circulum formante, munito. — Brasilia: Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

(1) *Tariona* nov. gen. a *Coryphasia* differt parte cephalica fere plana haud impressa, clypeo angusto glabro, metatarsis anticis aculeis inferioribus longis et utrinque aculeis lateralibus binis multo minoribus armatis, metatarsis posticis verticillo basali ex aculeis quinque. — Typus : *T. Gounellei* E. Simon.

Tylogonus (1) auricapillus sp. nov. — ♂. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax obscure rufo-castaneus, parte cephalica, saltem prope oculos, nigra, pilis longis sed depressis et obtusis viridi roseoque aurea-micantibus vestita, thoracica versus marginem valde infuscata fere nigra, lineis divaricatis niveo-pilosis notata. Pili oculorum supra oculos micantes, subtus albi. Clypeus angustus pilis albis longis uniseriatis munitus. Abdomen oblongum, atrum, supra longe et parce hirsutum et pilis micantibus conspersum, antice linea marginali alba exili, postice utrinque maculis parvis albis ornatum; subtus parce cinereo-pilosum. Sternum fusco-olivaceum, læve. Chelæ fulvæ, æneo-tinctæ, antice deplanatæ, subtiliter et parce striatæ, intus leviter arcuatæ, carinatæ et prope apicem dente magno armatæ. Pedes antiqui castanei, femoribus nigricantibus, metatarsis tarsisque dilutioribus, pedes postici lutei. Pedes-maxillares medio-cres, lutei; tibia patella circiter æquilonga, apophysibus binis, superiore parva fulva simplici et truncata, inferiore longiore, nigra, arcuata et inæqualiter bifida, extus armata; tarso bulboque (simplici) sat longe ovatis. — Ecuador merid. : Amazula (Gaujon).

T. prasinus sp. nov. — Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, pilis depressis subsquamiformibus læte aureis vestitus, parte thoracica in declivitate subglabra sed linea marginali tenui albo-pilosa cincta. Pili oculorum supra oculos flavo-aurei subtus albi. Clypeus angustus, subglaber, ad marginem setis longis albis paucis uniseriatis munitus. Abdomen nigrum, supra splendide viridiaureo-squamulatum, utrinque, prope medium, macula longa, postice, supra mamillas, puncto parvo, niveo-pilosis, decoratum, subtus parce albo-pilosum. Chelæ nigro-æneæ, crebre et tenuiter transversim striolatæ, leviter incurvæ, intus carinatæ et, paulo pone medium, apophysi acuta sat longa et infra directa, instructæ, marginibus sulci obtuse prominulis. Partes oris sternumque nigra. Pedes nigricantes, tibiis cunctis, metatarsisque 1ⁱ paris paulo dilutioribus et castaneis, tarsis cunctis, metatarsis coxisque posticis fulvis. Pedes-maxillares breves, nigri; tibia tuberculo humili sat lato apice depresso foveolato et subrotundo, apophysique apicali parva et gracili extus armata; tarso bulboque ovatis. — Amazonas : S. Paulo de Olivença (De Mathan).

Asaphobelis (2) physonychus sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos niger, fulvo-rufulo-

(1) *Tylogonus* nov. gen. a *Tariona* differt pedibus posticis multo minus aculeatis, metatarsis 3ⁱ paris aculeis basalibus parvis 2 vel 4, metatarsis 4ⁱ paris aculeis submediis 2 vel 3 aculeisque apicalibus tantum munitis. — Typus : *T. auricapillus* E. Simon.

(2) *Asaphobelis* nov. gen. a *Coryphasia* imprimis differt metatarso 3ⁱ paris aculeorum verticillis trinis instructo. — Typus : *A. physonychus* E. Sim.

pubescens, parte cephalica utrinque in declivitate et antice prope angulum albo-pilosa, parte thoracica utrinque fere glabra, sed vitta media lata albido-pilosa notata. Pili oculorum albi, supra oculos medios rufuli. Pili clypei densi et longi seriati albi. Abdomen ovatum, supra fusco-castaneum, in medio late dilutius, omnino luteo-nitido-pubescens, subtus atrum, parce albido-pilosum. Chelæ nigro-castaneæ, antice valde transversim rugoso-striatæ, convexæ et parallelæ, marginibus sulci brevibus, superiore ad angulum dentibus binis subgeminatis valde iniquis, 1° multo majore, inferiore carinula longa, radicem unguis fere attingente, inæqualiter fissa, ramulo 1° longe et oblique truncato securiformi, 2° parvo et acuto, ungue rufulo, in parte basali alte convexo subgloboso sed utrinque leviter compresso, in parte apicali abrupte angustiore, curvato subplicato. Partes oris nigro-castaneæ ad marginem dilutiores, laminæ extus dilatatæ et minute mucronatæ. Sternum obscure fulvum. Pedes longi, fusco-castanei, metatarsis anticis, coxis, metatarsis tarsisque posticis dilutioribus et fulvo-rufulis, metatarsis anticis longis et rectis aculeis inferioribus et utrinque aculeis lateralibus minoribus binis armatis. Pedes-maxillares sat robusti, fusci, femore ad apicem patellaque dilutioribus, luteo nigroque hirsuti; tibia patella brevior, apophysi apicali gracili recta et antice directa extus armata; tarso ovato; bulbo longo, ad basin retro producto, paulum ampliato et subgloboso, ad apicem stylo valido, circulum formante, munito. — Brasilia, prov. Bahia.

A. fasciiventris sp. nov. — ♂. Long. 8-9 mill. -- Cephalo-thorax fusco-castaneus, parte cephalica, saltem prope oculos, nigra, thoracica antice paulo dilutiore, fulvo-rufulo-pubescens (fere depilis). Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albi. Pili clypei densi, longi, albi, seriati. Abdomen ovatum, supra atrum, in medio late dilutius et fusco-punctatum, omnino flavido-nitido-pubescens, subtus vitta latissima nigra fere omnino obtectum. Chelæ nigro-æneæ, validæ, parum attenuatæ, antice ad basin convexæ, valde transversim rugoso-striolatæ, versus basin læviores, margine superiore sulci ad angulum remotum, dentibus binis subgeminatis valde iniquis, 1° majore, inferiore carinula longa, truncata, cum angulo postico breviter prominulo atque acuto, ungue valido, longo, curvato, simplici, ad basin haud inflato. Partes oris nigro-castaneæ, laminæ extus dilatatæ et minute mucronatæ. Sternum obscure fulvum. Pedes antici nigricantes, postici fusco-castanei, coxis metatarsis tarsisque dilutioribus ut in præcedenti aculeati, sed metatarsis, præsertim anticis, brevioribus, robustioribus et leviter curvatis. Pedes-maxillares fusco-castanei vel nigricantes, ut in præcedenti sed processu bulbi apice rotundo haud ampliato.

♀. Long. 10 mill. — Cephalothorax (depilis) fulvo-rufescens, parte cephalica rubro-castanea, maculis ocularibus nigris notata, thoracica vittis umbrosis radiantibus et abbreviatis, parum expressis, notata. Pili oculorum supra oculos flavidi subtus albi. Pili clypei albi seriati. Abdomen (depile) ovatum, fulvo-testaceum, supra crebre nigro-reticulatum, sed vitta media dilutiore lata, pone medium anguloso-ampliata, notatum, subtus vitta media nigra, lata, fere parallela sed postice breviter subacuta et mamillas haud attingente, munitum. Chelæ validæ, convexæ, fulvo-rufulæ, nitidæ, margine inferiore sulci carinula valde bidentata armato. Sternum pedesque fulvo-rufula, pedes antici reliquis vix obscuriores, aculeis numerosis, ut in mari ordinatis, instructi. Area genitalis plaga fulvo-rufula nitida, semicirculari, septo angusto longitudinali divisa, notata. — Brasilia, prov. Minas: Caraça; Theresopolis prope Rio.

Ptocasius fulvonitens sp. nov. — Long. 7-8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos niger, crebre fulvo-rufulo-pubescent, parte thoracica vitta media lata vix dilutiore notata. Pili oculorum supra oculos fulvo-aurantiaci, subtus albidii. Clypeus pilis crassis albis, transversim seriatis, munitus. Abdomen oblongum, obscure testaceum, fusco-variaturum, fulvo-luteo-pubescent, subtus albido-pilosum, vitta latissima nigricanti notatum. Sternum fulvo-olivaceum, læve et glabrum. Chelæ nigricantes, fere parallelæ, antice deplanatæ, valde coriaceo-rugosæ atque ad basin crasse albo-crinitæ. Pedes lutei, antici reliquis robustiores, fusco-castanei vel nigricantes, sed tarsis luteis. Pedes-maxillares lutei, tarso castaneo; patella vix longiore quam latiore; tibia patella paulo brevior, extus leviter angulosa et apophysi parva valde uncata armata; tarso magno, ad basin ovato, convexo et leviter obliquo, ad apicem abrupte angustiore tereti et recto; bulbo disciformi, basin tarsi tantum occupante, stylo libero circumdato. — Ins. Taprobane mont. : Maturata!

Panysinus vittatus sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, obscure rubro-pubescent, parte thoracica vitta media dilutiore et albo-pilosa ornata. Pili oculorum supra oculos rufi, subtus albi. Clypeus sub oculis anguste glaber, ad marginem vitta lata crasse albo-barbata ornatus. Abdomen atrum, supra rufulo-pubescent, vitta media lata integra albo-pilosa ornatum, subtus albo-pubescent. Chelæ parallelæ, nigræ, valde rugosæ, striatæ et crasse albo-crinitæ, sed apicem versus dilutiores, rufulæ et glabræ, margine superiore sulci dentibus binis subcontiguïs, inferiore carinula bidentata, dente 2° 1° majore, armatis. Sternum coxæque lutea. Pedes nigricantes, femoribus ad basin late luteis, metatarsis

tarsisque luteis, anticis infuscatis. Pedes-maxillares fusco-rufescentes, tarso dilutiore, longissime sed parum dense nigro-ciliati; patella paulo longiore quam latiore; tibia patella paulo brevior et angustior, apophysi apicali gracili, antice oblique directa extus armata; tarso longo, teretiusculo; bulbo longo, ad basin producto, ad apicem stylo, circulum formante, munito. — Java : Palabuan (Fruhstorfer).

P. grammicus sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigra, fulvo-rufulo-pubescent, parte thoracica vitta marginali vittaque media lata albo-pilosis ornata. Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albi. Clypeus pilis albis, crassis et longis, biserialim ordinatis, munitus. Abdomen supra atrum, fulvo-rufulo-pubescent, vitta media integra lata dilutiore et albo-pilosa ornatum, subtus testaceum, albo-pubescent. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelæ sat breves, nigro-nitidæ, ad basin pilis crassis albis paucis ornatæ, margine superiore bidentato, dente 1° subapicali mediocri, dente 2° remoto (submedio) sat longo et gracili sed obtuso, margine inferiore carinula furcata parva subapicali, instructis, ungue robusto, sat brevi, leviter flexuoso. Pedes fusco-castanei, coxis fulvis, antici reliquis robustiores, femoribus intus, patellis tibiisque fere nigris, tibiis metatarsisque subtus crebre nigro-ciliatis, postici femoribus ad basin metatarsisque fulvis, tarsis luteis. Pedes-maxillares castanei, parce et longe nigro-setosi; patella vix longiore quam latiore; tibia patella paulo brevior et angustior intus longissime crinita, extus apophysi apicali sat longa, recta et acuta, antice directa armata; tarso tibia cum patella paulo longiore et paulo latiore; bulbo basin tarsi tantum occupante, disciformi, rotundo, stylo libero omnino circumdato. — India merid. : Kodaikanel (Palni Hills).

P. semiermis sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco castaneus vel niger, crebre fulvo-rufulo-pubescent, vitta media lata parallela, antice medium areæ attingente, vittaque marginali lata, angulos anticos haud attingente, albo-pilosis, ornatus. Oculi ser. 2^a paulo ante medium siti. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, subtus albi. Clypeus sub oculis parce et longe cinereo-ciliatus, ad marginem pilis albis crassis et obtusis uniseriatis munitus. Abdomen supra nigrum, obscure rufulo-pubescent, vitta media lata et integra, dilutior et albo-pilosa ornatum, subtus omnino albido-luteo-pubescent. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelæ breves, sat latæ, nigrae, ad basin pilis clavatis albis paucis ornatæ. Pedes nigricantes, antici reliquis robustiores tarsis luteis, metatarsis tibiis multo brevioribus, postici metatarsis

tarsisque dilutioribus. Pedes-maxillares picei, parce nigro-setosi; patella paulo longiore quam latiore; tibia patella brevior, apophysi apicali simplici acuta, antice recte directa, armata; tarso sat anguste ovato; bulbo simplici. — Ins. Taprobane: Colombo!

Sidusa angulitarsis sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica utrinque late nigra et crebre fulvo-pilosa, in medio parce et minute micanti-squamulata, thoracica macula media albo-pilosa ornata. Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albi. Clypeus crebre niveo-barbatus. Abdomen supra fusco-testaceum, crebre micanti-squamulatum, antice arcu lato, dein maculis parvis obliquis biseriatis (5-5) albo-pilosis ornatum. Chelæ fulvæ, læves et parce albo-pilosæ, teretiusculæ, margine superiore sulci minute bidentato, inferiore carinula emarginata, equaliter bidentata, armatis. Partes oris sternumque fulva, laminæ extus rotundæ haud dentatæ. Pedes lutei, antici femoribus intus late nigricanti-vittatis, patellis ad basin infuscatis, tibiis (apice excepto) metatarso ad apicem nigricantibus, postici confuse annulati. Pedes-maxillares robusti et breves, pallide lutei, tarso infuscato, femore tibiaque et supra et intus longe albo-crinitis, extus nigro-pilosis; tibia patella paulo brevior, apophysi apicali nigra antice directa, recta sed apice minute uncata, extus armata; tarso magno, extus ad basin emarginato, dein tuberculo lato et obtuso munito; bulbo magno, præsertim intus valde convexo, apice stylo crasso, circulum formante, munito. — Brasilia, prov. Ceara: Serra Baturite (E. Gounelle); Serra Communaty (E. Gounelle).

Chloridusa (1) **viridiaurea** sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, squamulis læte viridi-aureis nitidis crebre vestitus, parte thoracica macula media parva, utrinque macula postoculari lineaque marginali exili albo-pilosis, ornata. Pili oculorum supra flavi subtus albi. Pili clypei albi. Abdomen angustum, supra crebre viridi-aureo æneove squamulatum, macula apicali parva nivea notatum, subtus nigro-testaceum, parce albo-pilosum, mamillis fulvis. Sternum fuscum nigrumve, parce albo-pilosum. Pedes sat longi, antici fusci, metatarso tarsoque dilutioribus, reliqui lutei femoribus leviter infuscatis, aculeis debilibus ordinariis armati. Pedes-maxillares nigricantes, parce nigro-pilosi sed femore crasse albo-hirsuto; patella parallela paulo longiore quam latiore;

(1) **Chloridusa** nov. gen. a *Sidusa* differt oculis anticis apicibus in lineam vix recurvam, tibiis anticis aculeis inferioribus 4-4, basalibus apicalibusque parvis, medianis longis, metatarsis anticis gracilibus haud fimbriatis, aculeis inferioribus longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis a sese valde iniquis, altero submedio longo altero apicali minutissimo. — Typus: *C. viridiaurea* E. Simon.

tibia patella vix brevior paulo angustior, extus apophysi apicali articulo haud brevior paululum arcuata, gracillima sed apice minute inflata, armata; tarso sat longe ovato; bulbo convexo, apice stylo gracili, circulum formante, munito.

♀. Long. 4-4,5 mill. — Cephalothorax fere maris sed parte cephalica albo-marginata, maculis albis postocularibus intus productis et vittam fere formantibus. Abdomen nigrum, micanti-squamulatum, vitta media lata fulva integra, antice linea exili valde arcuata, prope medium lineis binis interruptis, et postice, prope mamillas, maculis binis parvis niveo-pilosis structe decoratum. Pedes lutei, femoribus anticis infuscatis, reliquis ad apicem leviter umbrosis. Pedes-maxillares pallide flavi tarso fusco. Plaga genitalis plana, areis binis magnis subrotundis, concentrice striatis, notata. — Regio Amazonica tota.

Siloca (1) **sanguinceps** sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica utrinque late nigra, parce albo-pilosa, ad marginem frontalem posticeque, prope oculos, læte coccineo-pubescente, parte thoracica ad marginem atque in medio parce et longe albo-pilosa. Pili oculorum supra oculos coccinei, subtus albi. Clypeus dimidium oculorum mediorum saltem æquans, fulvus, parcesime pilosus fere glaber. Abdomen oblongum, crebre et longe hirsutum, supra fulvo-rufulo-pubescent, utrinque parce albo-pilosum et vitta media integra dilutior albo-pilosa ornatum, subtus fulvum, crebre et longe albo-luteo-pubescent. Sternum fulvum, parce albo-pilosum. Chelæ fulvæ, teretiusculæ, antice læves et muticæ, margine superiore sulci minute bidentato, inferiore carinula emarginata, equaliter bidentata, armato. Laminæ extus minute dentatæ. Pedes lutei, patellis tibiis metatarsisque 1ⁱ paris leviter infuscatis, metatarsis sex posticis apice minute fuscis, aculeis ordinariis numerosis et longis armati. Patella cum tibia 3ⁱ paris paulo brevior quam patella cum tibia 4ⁱ paris. Pedes-maxillares robusti, fulvi, femore tibia patellaque crebre et crasse coccineo-pilosis, femore tibiaque intus longissime nigro-crinitis et penicillatis, tarso fere nudo; tibia patella brevior, apophysi apicali gracili, antice directa sed apice leviter divaricata extus armata; tarso anguste ovato; bulbo ad basin producto et convexo, ad apicem stylo longo, circulum formante, munito. — Brasilia: Serra Communitat (E. Gounelle).

S. campestrata sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica utrinque late nigra, læte coccineo-

(1) *Siloca* nov. gen. a *Sidusa* differt pedibus 4i paris longioribus quam pedibus 3i paris, metatarsis anticis ut in *Chloridusa* aculeatis, tegumentis pilis simplicibus (haud squamiformibus) vestitis. — Typus: *S. sanguinceps* E. Simon.

pubescens, parte thoracica in medio atque ad marginem parce albo-pilosa. Pili oculorum coccinei. Pili clypei longissimi et biseriati albi. Abdomen obscure fulvum, postice arcubus tenuibus fuscis vix expressis notatum, albo-luteo rufuloque pubescens (fere depile). Mamillæ nigricantes. Sternum fulvum, albo-pilosum. Chelæ sat breves, convexæ, fulvo-nitidæ, ad basin albo pilosæ. Pedes lutei, tibiis metatarsis, tarsisque 1ⁱ paris subtus crebre nigro-ciliatis. Pedes-maxillares robusti, pallide lutei, longissime albo-hirsuti; patella vix longiore quam latiore; tibia patella brevior, apophysi apicali parva, simplici, antice oblique directa, extus armata; tarso magno sat late ovato, ad basin atque ad apicem attenuato; bulbo ad basin producto et obtusissimo, ad apicem area magna disciformi, stylo longissimo, circulum duplicem formante, circumdato, munito. — Brasilia : Matto-Grosso.

Gedea (1) **flavogularis** sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, pilis pronis, in parte cephalica incurvis, albidis rufulisque mixtis, vestitus. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, subtus flavidi. Clypeus omnino crebre et longe flavido-barbatus. Abdomen breve, fuscum, vitta media lata, postice valde transversim ampliata cruciata et lineolas fuscas seriatas includente, notatum, albido rufuloque pubescens, subtus parcius cinereo-pilosum. Sternum nigrum, parce albo-pilosum. Chelæ rufulæ, longæ, antice planæ, ad marginem anteriorem subacutæ, apicem versus convexæ et longissime flavido-penicillatæ, marginibus sulci sat longis, inferiore carinula trifida munito. Pedes sat longi, fulvi, albido-pilosi, fusco-annulati, coxis femoribusque quatuor anticis valde infuscatis fere nigris. Pedes-maxillares lutei, tarso infuscato excepto, intus longe et crebre niveo-hirsuti; tibia patella brevior, apophysi apicali parva, depressa sed acuta, apice minute uncata et supra longe crinita armata; tarso longo, cylindrato; bulbo magno, ovato, ad basin producto et obtuso, intus stylo crasso et arcuato munito. — Java : Palabuan (Fruhstorfer).

Lophostica (2) **mauriciana** sp. nov. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, crebre coriaceus, parte thoracica in declivitate læviore, antice, inter oculos, sulco parvo foveolato, dein striis binis abbreviatis et divaricatis impressa, parte cephalica (fere omnino

(1) **Gedea** nov. gen. ab *Emathidi* differt metatarsis anticis aculeis inferioribus debilibus 2-2 armatis sed aculeis lateralibus carentibus, parte cephalica plana, haud impressa, clypeo maris oculis mediis haud angustior. — Typus : *G. flavogularis* E. Simon.

(2) **Lophostica** nov. gen. ab *Emathidi* differt metatarsis anticis aculeo laterali unico, inferioribus fere simili, utrinque armatis, parte cephalica plana haud impressa, quadrangulo oculorum lato et parallelo, postice cephalothorace vix angustiore. — Typus : *L. mauriciana* E. Simon.

depili) utrinque rubro-pilosa. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus ad marginem setis albidis longis paucis uniseriatis munitus. Abdomen supra obscure testaceum, nigro-marginatum, prope medium vitta transversa angulosa fusca et prope apicem utrinque macula obliqua nigra notatum, fulvo-nitido-pubescent (?). Chelæ piceæ, breves, extus convexæ. Sternum fuscum. Pedes fusco-rufescentes, femoribus metatarsis tarsisque paulo dilutioribus, tibiis metatarsisque 4ⁱ paris in medio late infuscatis fere nigris. Pedes-maxillares feminae sat longi, fusci, ad basin dilutiores, tarso leviter ovato, acuminato. Plaga genitalis antice attenuata, truncata et foveolis binis subrotundis impressa, postice plagula fusco-nitida transversa notata. — Ins. Mauricia.

Pristobæus (1) **jocosus** sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, marginem versus sensim obscurior, rufulo-pubescent, parte cephalica prope oculos nigra, præsertim antice fulvo-pilosa, thoracica vitta media vittaque marginali, postice late interrupta, albido-luteo-pilosis decoratis. Pili oculorum fulvo-aurantiaci, pili clypei flavidi, crassi, longissimi et biseriati. Abdomen supra fuscum, fulvo rufulo-pubescent, vitta media dilutiore, postice leviter dentata et albido-pilosa ornatum, subtus testaceum, parce albo-pilosum. Sternum luteum. Chelæ latæ, antice leviter convexæ et valde coriaceæ, æneæ, ad basin crasse sed parce flavido-pilosæ, margine inferiore sulci carinula remota, humili sed longe et inæqualiter trifida munito. Pedes fulvo-rufuli, quatuor antici, præsertim femoribus ad apicem tibiisque obscuriores, metatarsis tarsisque cunctis luteis, metatarsis ad basin atque ad apicem confuse fusco-annulatis, metatarso 1ⁱ paris aculeis inferioribus longis 2-2 atque intus aculeis minoribus binis, metatarso 2ⁱ paris similiter aculeato sed aculeo exteriori parvo apicali armato. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, parce nigro-criniti; tibia patella saltem æquilongia, paulo graciliore, aculeis longissimis trinis atque apophysi apicali rufula, gracili, secundum marginem tarsi ducta, instructa; tarso tibia paulo longiore vix latiore, apice parum attenuato; bulbo parvo ovato, basi attenuato et producto, apice stylo tenui curvato munito. — Celebes.

Pseudemathis (2) **trifida** sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax nigricans, parte thoracica paulo dilutiore et saltem

(1) **Pristobæus** nov. gen. ab *Emathidi* differt clypeo creberrime barbato, metatarsis anticis aculeis lateralibus binis intus munitis sed extus aculeis lateralibus carentibus. — Typus : *P. jocosus* E. Simon.

(2) **Pseudemathis** nov. gen. ab *Emathidi* differt clypeo in utroque sexu crebre barbato, chelarum margine inferiore carinula emarginata tridentata, dente medio angularibus multo minore, pedibus anticis maris multo longioribus, metatarsis gracilibus et rectis tibiis circiter æquilongis. — Typus : *P. trifida* E. Simon.

in medio rufescenti-tincta, cephalica pilis pronis rubro-aureis nitidis vestita, thoracica rufulo-pubescenti et vitta media luteo-pilosa ornata. Pili oculorum rubri. Clypeus creberrime flavido-barbatus. Abdomen oblongum, supra fuscum, vitta media dentata dilutior et flavido-pilosa ornatum, subtus testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Sternum fuscum. Chelæ nigro-æneæ, glabræ, leviter coriaceæ, robustissimæ, antice et extus valde convexæ, intus ad basin carinatæ et contiguæ, dein divaricatæ, margine superiore sulci dentibus validis binis remotis, inferiore carinula trifida munitis, ungue simplici, robusto et longo. Pedes longi, antichi fusco-castanei, reliqui lutei valde fusco-plagiati et variegati. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco-refescentes, tibia tarsoque longissime sed parum dense luteo-crinitis; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia patella longiore et graciliore, apophysi apicali parva et acuta armata; tarso tibia non multo longiore, angusto et teretiusculo; bulbo ovato, apice oblique truncato et stylo longo gracili et subrecto munito.

♀. Long. 8 mill. — Cephalothoracis pars cephalica rubro-castanea utrinque nigra, pilis pronis micantibus vestita, thoracica fusco-testacea vitta dilutior notata. Pili oculorum supra oculos rubri subtus albi. Pili clypei albi, longi et uniseriati. Abdomen oblongum, supra fuscum, parce testaceo-punctatum et vitta media testacea valde sinuosa et coarctata, punctos fuscos biseriatis includente, ornatum, subtus testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Sternum fulvum. Chelæ robustæ et convexæ, fusco-castaneæ, nitidæ et glabræ. Pedes fulvi, vix distincte olivaceo-variegati. Plaga genitalis ovata, longior quam latior, antice rotunda, postice truncata, albido-testacea et postice carinula longe triquetra divisa. — Ins. Mauricia.

Cytæa oreophila sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigra, thoracica vitta submarginali dilutior cincta, omnino crebre (ad marginem frontalem longius) fulvo-albido-pilosus vix squamulatus. Pili oculorum fulvo-rufescentes, sub oculis mediis albi. Clypeus omnino crebre niveo-barbatus. Abdomen longum, supra atrum, luteo-nitido-squamulatum, subtus dilutius et niveo-squamulatum. Chelæ sat debiles et parallelæ, in dimidio basali crebre niveo-hirsutæ, in medio nigrae et glabræ, ad apicem fulvæ, longe sed parcius albo-crinitæ, margine superiore sulci dentibus trinis, ultimo reliquis minore, inferiore carinula sat longa bidentata, dente 2° 1° majore. Sternum pedesque omnino fulvo-ravida, pedes aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares fusco-olivacei, albido-pilosi, sat breves et robusti; femore curvato; tibia patella vix brevior, supra ad apicem leviter incrassata et recte secta, extus, ad angulum inferiorem apophysi nigra

longa et obliqua, compressa, apice ampliata et malleiformi, armata; tarso sat crasse ovato; bulbo ovato, convexo, apice stylo, circulum formante, munito. — Java : Mons Teugger (H. Fruhstorfer).

C. hæmatica sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvus vel fusco-castaneus, parte cephalica nigra, in medio roseo ad marginem albo-micanti-squamulata, thoracica linea media exili vittaue marginali latissima niveo-squamulatis ornata. Pili oculorum læte aurantiaci sub oculis mediis albi. Clypeus pilis densis longis et decumbantibus splendide roseo-micantibus vestitus. Abdomen longum, supra olivaceum, zonis transversis confusis obscurioribus notatum, crebre pallide viridi-micanti-squamulatum et prope medium, vitta transversa latissima, sæpe interrupta, læte rubropilosa decoratum, subtus luteo-testaceum, parce albo-micanti-squamulatum, postice vitta obscuriore evanescente notatum. Mamillæ fuscae. Chelæ longæ, antice deplanatæ et coriaceæ, extus in parte apicali tenuiter carinatae, fulvo-rufulæ, ad basin nigræ et albo-micanti-squamulatæ. Pedes sat longi, fulvo-olivacei, antichi obscuriores et castanei, femoribus (posticis exceptis) tibiisque anticis utrinque infuscatis et subvittatis, aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares sat graciles et longi, fulvi, tarso infuscato, parce micanti-squamulati; tibia patella saltem haud brevior, apicem versus leviter et sensim incrassata, apophysi apicali nigra acuta et uncata armata; tarso sat angusto et longo, apice curvato; bulbo sat longe ovato, apice stylo longo, circulos duos formante, munito. — Java : Palabuan; ins. Lombok (Fruhstorfer).

C. æneomicans sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigra æneo-squamulata, thoracica vitta lata semicirculari vittaue submarginali angustiore, niveo-squamulatis ornata. Pili oculorum fulvi. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem setis nigris longis et erectis uniseriatis munitus. Abdomen angustum, supra nigrum, utrinque punctis binis niveis, in medio vitta lata sinuoso-dentata fulva crebre subaureo-squamulata atque in dimidio apicali albo-dentata læte decoratum, subtus obscure testaceum, postice fusco-notatum et utrinque vitta albo-squamulata marginatum. Mamillæ fusco-testaceæ. Chelæ parallelæ, convexæ, haud carinatæ, castaneæ, pilis longis albido-nitidis vestitæ. Partes oris sternumque fusco-olivacea. Pedes olivacei, antichi obscuriores, postici confuse fusco-plagiati et subannulati, cuncti albido-nitido-squamulati, aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares modice longi, parum robusti, olivacei, albo-pilosi, femore ad basin fere nigro; tibia teretiuscula patella saltem æquilonga, apophysi apicali nigra sat gracili acuta et curvata, extus armata; tarso ovato; bulbo longo, rufulo, apice stylo nigro curvato munito. — Ins. Lombok (Fruhstorfer).

Plotius (1) **breviusculus** sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, lævis, parte cephalica utrinque late nigra, supra pallide fulvo in declivitate postice atque ad marginem frontalem niveo-squamulatus. Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albi. Clypeus altus, parce fulvo-squamulatus. Abdomen breve, atrum, supra crebre pallide fulvo-squamulatum, subtus parcius niveo-squamulatum. Sternum fusco-olivaceum, læve, longe albo-pilosum. Chelæ læves, fere glabræ, fusco-olivaceæ. Pedes lutei, coxis trochanteribusque longe albo-pilosis, reliquis articulis albo-squamulatis, femoribus, præsertim anticis subtus late nigricanti-plagiatis, tibiis ad basin atque in medio, metatarsis tantum ad basin nigricanti-annulatis. Pedes-maxillares albidi, femore infuscato, longe albo-pilosi. Plaga genitalis nitida, ovato transversa, carinula media angusta et utrinque lobo ovato notata. — Ins. Taprobane : Kandy!

P. curtus sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger subtiliter coriaceus, crebre fulvo-cinereo-nitido-pubescent, vitta marginali latissima, postice interrupta, albo-pilosa, ornatus. Pili oculorum et clypei creberrimi pallide fulvi. Abdomen breve, supra fuscum et fulvo-pubescent, antice arcu lato, dein lineolis transversis valde sinuosis albido-subsquamulatis ornatum, subtus macula maxima nigra notatum. Chelæ sat breves sed latissimæ, antice deplanatæ et subquadratæ, nigro-castaneæ, apice rufulæ, glabræ opacæ, valde rugoso striolatæ, margine superiore dentibus quinque iniquis, inferiore carinula fere æqualiter bifida armatis. Partes oris sternum coxæque intense nigra. Pedes fulvo-rufuli, antici obscuriores fere castanei, femoribus anticis supra fere usque ad basin, posticis ad apicem nigricantibus, aculeis numerosis armati. Pedes-maxillares mediocres, fulvo-rufuli; patella tibiaque supra leviter deplanatis, fere æquilongis, tibia utrinque longissime albo-hirsuta, apophysi apicali gracili sed depressa, recta et antice directe extus armata; tarso sat longe ovato, albo-piloso; bulbo longo, ovato, ad basin attenuato sed non producto, ad apicem stylo crasso nigro, circulum formante, munito. — Ins. Halmahera : Edkor.

Servæa murina sp. nov. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica antice paulo dilutiore et rufescenti-tincta, leviter coriaceus, omnino luteo-sericeo-pubescent, parce et longe nigro-crinitus. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus ad marginem

(1) *Plotius* nov. gen. a *Cytæa* differt quadrangulo oculorum parallelo, postice cephalothorace haud angustiore, parte thoracica quadrangulo haud longiore, postice fere abrupte declivi, oculis lateralibus anticis a mediis late remotis. — Typus : *P. curtus* E. Simon.

setis albis longissimis et decumbantibus crebre seriatis hirsutus. Abdomen oblongum, depressiusculum, supra obscure testaceum, confuse fusco-variatum et segmentatum, crebre luteo-sericeo-pubescent, subtus albidum et albo-pubescent, sed vitta transversa latissima nigra valde arcuata notatum. Chelæ nigro-nitidæ, valde et obtuse sinuoso-plicatæ, margine inferiore sulci dente parvo obtuse bifido armato, ungue brevi, crasso et subrecto. Partes oris nigro-castaneæ, laminæ testaceo-marginatæ. Sternum pedesque antichi fusco-castanei, reliqui pedes fulvi et fusco-annulati, cuncti luteo-pubescentes et longe hirsuti, metatarso 1ⁱ paris aculeis inferioribus validis et longis 2-2 armato sed aculeis lateralibus carente, metatarso 2ⁱ paris aculeis inferioribus aculeisque lateralibus interioribus binis armato. — Java : Palabuan (Fruhstorfer).

Microhasarius (1) pauperculus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, tenuissime nigro-marginatus, parte cephalica utrinque late nigra, pilis longis sordide albidis vel pallide luteis vestitus. Pili oculorum supra oculos lutei, subtus albid. Clypeus angustus, fere nudus. Abdomen breviter ovatum, subrotundum, antice obtuse emarginatum, pallide testaceum, supra utrinque parce fusco-punctatum et antice vitta longitudinali abbreviata fusca notatum. Chelæ, sternum, pedesque pallide lutea, parte labiali infuscata. Pedes breves, confuse olivaceo-variegati et subannulati. Plaga genitalis rufula, plana, antice area ovata longitudinali, postice valde attenuata areaque transversa notata. — Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

Trite lucida sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax crassus et altus, utrinque sat ample dilatatus et oculorum seriei posticæ multo latior, fulvo-rufescens, albo-flavido pubescens, parte cephalica dilutiore et lucida sed utrinque, prope oculos, minute nigra. Pili oculorum coccinei. Clypeus subglaber. Abdomen ovatum, supra fusco-testaceum, vitta marginali flavida vittaque media flavida, sed lineam longitudinalem lineasque transversas arcuatas fuscas includente, notatum, subtus testaceum. Partes oris chelæque castaneæ. Chelæ robustæ, paululum divaricatæ, leviter transversim striatæ et prope basin æneo-tinctæ. Sternum pedesque lutea. Pedes antichi reliquis multo crassiores, femoribus exceptis, fulvo-ravidi. Pedes maxillares sat longi, graciles, lutei; femore longo et arcuato; patella tereti, circiter duplo longiore quam latiore; tibia patella plus triplo brevior, angustior, apophysi apicali nigra, parva, valde attenuata sed apice minute ampliata et truncata, extus

(1) **Microhasarius** nov. gen. ab *Hasario* et *Cytæa* imprimis differt parte labiali latiore quam longiore semicirculari, sterno late cordiformi haud longiore quam latiore. — Typus : *M. pauperculus* E. Simon.

armata; tarso angusto; bulbo simpliciter ovato, ad basin obtuse et breviter producto, apice stylo nigro curvato munito.

♀. Long. 7,5 mill. — A mari differt cephalothorace multo angustiore et area oculorum non multo latiore, pedibus anticis chelisque multo brevioribus, pilis oculorum et clypei omnino albido-luteis. Plaga genitalis rufula, coriacea, leviter convexa, antice fovea sat profunda, transversim cordiformi, impressa. Chelarum margo inferior dentibus binis subæquis atque acutis, armatus. — Nova Zeelandia.

Beata Germaini sp. nov. — ♀. Long. 6,7 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, utrinque, prope oculos, nigricans, subtilissime coriaceus, fulvo-pilosus et squamulatus. Pili faciei omnino fulvo-aurantiaci. Oculi antici in lineam valde recurvam. Abdomen late ovatum, supra albido-testaceum sed area maxima fusca, utrinque validissime dentata et laciniosa, testaceo-punctata, notatum, subtus fusco-violaceum. Sternum nigro-nitidum. Chelæ robustæ, antice, præsertim intus, valde coriaceæ et striolatæ, margine inferiore carinula humili bidentata, dente 2° 1° majore, munito. Coxæ quatuor anticæ nigro-fuscae, reliquæ fulvæ. Pedes antici fusco-rufescentes, femoribus validis et subclavatis nigricantibus, tarsis metatarsisque fulvis. Pedes postici fulvi, femoribus infuscatis, reliquis articulis rufescenti-annulatis, aculeis ordinariis armati. Plaga genitalis minuta, rufula, subrotunda, antice foveolata. — Brasilia, prov. Minas: Caraça (E. Gounelle); Paraguay (Germain).

B. cinereo-nitida sp. nov. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, coriaceus, squamulis cinereo-nitidis micantibus vestitus, vitta submarginali lata, postice late interrupta, albido-luteo-pilosa, cinctus. Pili oculorum fulvi. Clypeus angustus, pilis longissimis albis uniseriatis munitus. Abdomen breviter ovatum, atrum, supra cinereo-micanti-squamulatum, versus marginem albidius, utrinque, prope medium, linea, circulum fere formante, dein lineis minoribus obliquis albido-squamulatis ornatum, subtus parce albo-squamulatum. Sternum parvum, nigrum, parce albo-pilosum. Chelæ sat breves, fere parallelæ, nigro-nitidæ, glabræ et leviter transversim striatæ, margine superiore sulci minute bidentato, inferiore carinula brevi, apice truncata cum angulo posteriore dentato, munito. Pedes parce albo-squamulati. Pedes 1ⁱ paris reliquis robustiores, femore subclavato, nigri tarso luteo. Pedes 2ⁱ paris nigri, coxa obscure fulva, metatarso tarsoque luteis. Pedes postici lutei, femoribus nigris, reliquis articulis valde nigro-annulatis. Pedes-maxillares graciles, nigri, parce albo-squamulati. Fovea genitalis magna, ovata, antice rotunda, postice truncata, carinula

fusco-nitida, antice angusta sed postice valde ampliata et triquetra divisa. — Brasilia : Sao Antonio da Barra (E. Gounelle).

Stertinus splendens sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fere æque longus ac latus, antice utrinque valde dilatato-rotundus, antice breviter postice longe et sensim attenuatus, supra deplanatus, niger, utrinque ad angulum leviter dilutior et rufescens, crebre coriaceus, sed prope oculos leviter convexus et nitidus, squamulis splendide viridi-aureis crebre vestitus, genis et facie utrinque violaceo-micanti-squamulatis. Oculi antichi apicibus in lineam vix recurvam, laterales a mediis spatio oculo laterali saltem duplo angustiore sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra duriusculum, nigrum, crebre viridi-aureo-squamulatum, subtus in medio atrum et subglabrum. Sternum nigrum, parce viridi-squamulatum. Chelæ sat longæ, divaricatæ et arcuatæ, nigro-piceæ, læves, vitta viridi-aureo-squamulata ornata, supra, prope apicem apophysi magna, erecta longa et subacuta, subtus, ad marginem inferiorem, apophysi submedia recta seu leviter incurva denteque remotiore fere æquilonga sed graciliore, apice acuta et leviter curvata et postice dentata, insigniter armata, ungue longo, valido et leviter sinuoso, apice abrupte angustiore, compresso et arcuato, antice ad basin apophysi rufula maxima erecta curvata et obtusa, atque prope medium tuberculo minore armato. Pedes nigro-picei, coxis, metatarsis ad basin, tarsisque posticis dilutioribus, femoribus patellis tibiisque supra parce viridi-aureo-squamulatis. Pedes 1ⁱ paris reliquis longiores, tibia cylindracea haud inflata, aculeis exterioribus trinis minutissimis aculeoque interiore subapicali majore subtus armata. Pedes-maxillares gracillimi et longissimi, fusco-picei, femore patellaque supra viridi-aureo-squamulatis.

♀. Long. 6 mill. — Mari subsimilis sed cephalothorace utrinque ample rotundo, antice posticeque fere æqualiter attenuato, pilis oculorum rufulis, chelis latioribus et brevioribus, apophysibus carentibus, fusco-piceis sed in parte basali squamulis splendide aureis ornatis, margine inferiore sulci carinula valde emarginata et tridentata, dente medio reliquis minore, armato, pedibus 1ⁱ paris brevioribus et crassioribus, tibia aculeis exterioribus trinis parvis, interioribus binis, multo majoribus et subapicalibus, subtus munita. Pedes-maxillares supra deplanati, obscure fulvi, albo-pilosi et parce aureo-squamulati. — Celebes : Bua Kraeng (Fruhstorfer).

S. pilipes sp. nov. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax latus, utrinque ample rotundus, supra deplanatus, niger, crebre coriaceo-rugosus, pilis squamiformibus albido-luteis fulvisque crebre vestitus. Pili oculorum albido-lutei, sub oculis fere albi. Clypeus longe albido-barbatus. Oculi antichi apicibus in lineam rectam,

laterales a mediis spatio oculo laterali fere duplo angustiore sejuncti. Abdomen longe oblongum, supra duriusculum et sigillis biseriatis impressum, fusco-rufulum, albido-squamulatum, antice vitta latissima confusa pallide fulvo-squamulata, utrinque lineis abbreviatis obliquis et postice, supra mamillas, lineis binis parvis fuscis notatum, subtus albo-nitido-squamulatum et lineis binis nigris glabris notatum. Sternum nigrum, ad marginem albo-nitido-squamulatum. Chelæ nigræ, valde coriaceæ, ad basin minute squamulæ, margine inferiore sulci carinula valde emarginata et tridentata, dente medio reliquis minore, munito. Pedes 1ⁱ paris reliquis multo robustiores, femore late clavato, tibia subtus leviter convexa, nigricantes, patella metatarso tarsoque dilutioribus, albido-pilosi, patella tibiaque supra parce nitido-squamulatis, tibia subtus sat crebre nigro-pilosa, pedes sex posteriores pallide fusci apice lutei, lineis albo-squamulatis ornati. — Ins. Luzonia : Manila! Quingua!

S. capucinus sp. nov. — ♂. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax paulo latior quam longior, antice utrinque valde dilatato-rotundus, dein subparallelus, postice breviter et fere abrupte angustior, nigro-piceus, valde coriaceo-rugosus, squamulis albido-nitidis vestitus. Pili oculorum et clypei pauci longi, tenues, albido-lutei. Oculi laterales a mediis spatio oculo laterali vix angustiore sejuncti. Abdomen breve, supra duriusculum et late sigillatum, nigrum, squamulis in medio albo-nitidis, utrinque luteis, vestitum, subtus sordide albido-pilosum. Chelæ latæ, antice planæ et coriaceæ, extus dilatato-rotundæ et granuloso-carinatæ sed muticæ, subtus dente marginali parvo et remotissimo armatæ, ungue longo, mutico, ad basin crasso et tereti, dein abrupte angustiore, compresso et arcuato. Pedes 1ⁱ paris nigro-picei, longi, trochantere tereti coxa vix brevior, femore longe claviformi, tibia tereti aculeis exterioribus trinis minutissimis inter se æquidistantibus, aculeoque interiore subapicali validiore subtus armata, metatarso sat longo, aculeis validis sat brevibus 2 2 armato. Pedes reliqui fusco-picei, coxis dilutioribus, metatarsis tarsisque luteis, metatarsis ad basin atque ad apicem minute fuscis. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco-picei.

♀. — Long. 6 mill. — A mari differt cephalothorace abdomineque squamulis pallide luteis vestitis, pilis oculorum fulvo-rufulis, clypei luteis, chelis crassioribus, antice deplanatis sed ad basin valde convexis et geniculatis, carinula inferiore tri vel quadridentata, dentibus medianis angularibus multo minoribus, pedibus anticis crassioribus et brevioribus, trochantere brevi, tibia aculeis inferioribus 3-3 munita, metatarso brevior, aculeis inferioribus multo longioribus 2-2 subtus armata. — Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

S. patellaris sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax paulo latior quam longior, subparallelus sed postice breviter et sat abrupte angustior, supra deplanatus, fusco-piceus, prope oculos niger, valde coriaceo-rugosus, squamulis albo-argenteis violaceoque micantibus vestitus. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, subtus albido-lutei. Pili clypei longi, pallide lutei. Oculi antici apicibus in lineam rectam seu leviter procurvam, laterales a mediis spatio oculo laterali paulo minore sejuncti. Abdomen breviter ovatum, antice obtuse truncatum, supra duriusculum, nigrum, squamulis splendide violaceo-micantibus vestitum et maculis aureo-squamulatis ornatum, subtus cinereo-pilosum. Chelæ breves, divaricatæ, antice deplanatæ, extus valde convexæ et prominulæ, intus, juxta radicem unguis, tuberculo parvo et obtuso munitæ, nigræ, valde coriaceæ et parce aureo-squamulatæ, margine inferiore longo carinato, dente remotissimo sat angusto, postice tuberculato, armato, ungue longo, antice, prope basin, depresso et excavato, dein tuberculo humili et obtusissimo instructo. Pedes 1ⁱ paris fusco-castanei, tarso luteo, tibia patellaque supra micanti-squamulatis, trochantere coxa non multo brevior, patella longissima, supra deplanata et intus carinata, tibia patella haud longiore, supra leviter deplanata, aculeis exterioribus trinis, basali minore, aculeisque interioribus binis subapicalibus longioribus armata, metatarso sat brevi, aculeis longis 2-2 munito. Pedes reliqui flavi, coxis trochanteribus femoribusque nigris. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco-castanei, parce micanti-squamulati. — Ins. Halmahera : Edkor.

Simæthula (1) **janthina** sp. nov. — ♀. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax abdomenque nigra, squamulis rufo-violaceis splendide micantibus omnino vistita, cephalothorax subtiliter sed crebre scrobiculato-punctatus. Pili oculorum pauci albidii. Clypeus pilis longis crebre uniseriatis albo-argenteis ornatus. Abdomen subtus parce cinereo-pubescent. Sternum nigro-nitidum. Pedes nigri tarsis cunctis metatarsisque sex posticis luteis. Pedes-maxillares nigri, patella tibia tarsoque supra leviter deplanatis et albo-pilosis. — Queensland : Cooktown.

Phyaces (2) **comosus** sp. nov. — ♂, ♀. Long. 3-4 mill. — Cephalothorax niger, crebre et minute granulosus, supra fulvo-

(1) **Simæthula** nov. gen. a *Stertinio* et *Heratemidi* differt oculorum linea antica leviter *procurva*, oculis ser. 3^æ ab oculis anticis quam ad angulos posticos cephalothoracis saltem quintuplo remotioribus. — Typus: *S. janthina* E. Simon.

(2) **Phyaces** nov. gen. a *Stertinio*, *Irura* et *Stergusa* differt oculorum linea 3^a cephalothorace haud angustiore, tegumentis pilis simplicibus pronis vestitis, abdomine antice acuminato et longissime penicillato. — Typus : *P. comosus* E. Simon.

rufulo in lateribus pallide luteo-pubescens, parte cephalica utrinque maculis seriatis albo-pilosis, fasciculisque trinis erectis, ad basin nigris ad apicem rufulis, 1° pone oculos medios, reliquis prope medium sitis, ornata, parte thoracica cristas binas setarum flavidarum munita. Pili oculorum et clypei (longissimi) crassi et flavidi, sed supra oculos medios rufuli. Abdomen breve, antice elevatum sed obtusum, postice declive, fuscum, supra cervino-pubescens, punctis albis quatuor, figuram rhomboidalem designantibus, et utrinque vittis abbreviatis et obliquis trinis albido-pilosis ornatum, ad marginem anticum setis crassis longissimis (cephalothorace longioribus) ad radicem cinereis ad apicem flavidis, fasciculum maximum, depressum, et antice oblique directum formantibus, insigniter ornatum. Chelæ nigræ, glabræ, breves, antice deplanatæ et valde inæquales. Partes oris, sternum coxæque nigra vel fusco-castanea fere glabra. Pedes fulvo-rufuli, crasse et longissime flavido-hirsuti, antici paulo obscuriores, femore late clavato subtus nigro-cyaneo, metatarsis tarsisque sex posticis luteis, metatarsis apice minute nigro-annulatis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, femore patella tibiaque longissime flavo-hirsutis; tibia patella paulo angustiore, apophysi apicali parva et acuta munita; tarso sat angusto; bulbo simplici. — Ins. Taprobane!

Uroballus (1) **octovittatus** sp. nov. — Long. 3 mill. — Cephalothorax fusco-rufulus, parte cephalica nigricanti, minute coriaceo-rugosus, crebre fulvo-cinereo-pubescens, et vittis transversis binis atro-cœruleo-pilosis ornatus, vitta antica angusta et recurva, inter oculos posticos ducta, altera latiore. Pili oculorum et clypei longi, sordide albidi. Abdomen depressiusculum, postice attenuatum, supra fulvum et luteo-pubescens, vittis transversis rectis et integris nigricantibus, atro-cyaneo-pilosis, medianis reliquis latioribus, ornatum, subtus pallide testaceum, albido-pilosum. Mamillæ inferiores luteæ, superiores longissimæ et tenues, nigræ, superne linea niveo-pilosa ornata. Chelæ fusco-rufescentes. Partes oris, sternum coxæque 1ⁱ paris fusco-olivacea. Pedes 1ⁱ paris robustissimi, fusco-olivacei vel castanei, femore supra patellaque ad basin dilutioribus, reliqui pedes lutei, minute fusco-variati. Pedes-maxillares nigri, tarso angusto, bulbo simplici.

♀. Long. 3,5 mill. — A mari differt abdominis vitta 2^a antice anguloso-dentata, pedibus-maxillaribus nigris ad basin paulo dilutioribus. — Ins. Taprobane!

(1) **Uroballus** nov. gen. a *Phyaceæ* differt abdomine antice rotundo nec acuminato nec penicillato, mamillis superioribus gracillimis et longissimis, abdomine toto vix brevioribus. — Typus : *U. octovittatus* E. Simon.

U. henicurus sp. nov. — ♂. — Long. 3 mill. — A præcedenti differt, cephalothorace omnino fulvo-pubescenti haud vittato, vittis abdominis extus latis et subcontiguïs sed intus acuminatis atque in medio late interruptis, abdomine subtus pallide-testaceo, vittis trinis nigris punctatis et sæpe confusis ornato. — Ins. Taprobane!

Stergusa aurichalcea sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, parte thoracica paulo dilutiore et rufescenti-tincta, pilis squamiformibus longis pronis et striatis fulvo-aureis vestitus, utrinque in declivitate vitta lata, in medio maculis confusis binis geminatis albidius-squamulatis notatus. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus crebre et longe albo-barbatus. Abdomen oblongum, sigillis coriaceis biseriatis 3-3, anticis parvis, reliquis maximis, notatum, fulvo-nitido-pubescent, vitta media lata fusca sinuosa, postice valde dentata ornatum, subtus nigrum, cinereo-pubescent. Sternum nigrum. Chelæ fusco-rufulæ, antice parce rugosæ, attenuatæ et divaricatæ, marginibus sulci longis, leviter depressis, inferiore tuberculo apicali parvo et obtuso denteque remoto longo et acuto armato, ungue valido et longo, antice, prope medium, obtuse tuberculato. Pedes 1ⁱ paris reliquis robustiores, fulvo-rufuli, femore nigro, patella longissima. Pedes sex postici lutei, coxis femoribusque infuscatis, tibiis metatarsisque apice anguste fusco-annulatis. Pedes-maxillares graciles, fusci, squamulis fulvo-aureis vestiti; tibia patella paulo brevior mutica, utrinque longe ciliata; tarso angusto; bulbo simplici.

♀. Long. 3,2 mill. — A mari differt chelis fere parallelis, margine inferiore sulci carinula inæqualiter tridentata munito, pedibus-maxillaribus depressis, crebre albo-argenteo-squamulatis. Area genitalis tuberculis binis rufulo-nitidis, ovato transversis, notata. — Ins. Taprobane : Colombo!

S. aurata sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica nigricanti et subtiliter rugosa, squamulis fulvo-aureis vestitus. Pili oculorum fulvi. Pili clypei albidi, creberrimi, in medio longi. Oculi parvi ser. 2^æ evidenter ante medium siti. Abdomen oblongum, fuscum, fulvo-nitido-squamulatum, vitta media lata obscuriore confusa notatum et sigillis coriaceis biseriatis 3-3, posticis majoribus, impressum, subtus atrum. Chelæ nigræ, coriaceo-granulosæ, divaricatæ, marginibus sulci longis, dentibus remotis, ungue longo et valido, prope medium abrupte angustiore et supra minute dentato. Sternum nigrum. Pedes 1ⁱ paris crassissimi nigricantes, aureo-squamulati, patella ad basin tarsoque dilutioribus, patella tibia metatarsoque superne leviter deplanatis. Pedes-maxillares sat graciles, fusci, aureo-squamulati, depressi; bulbo sat convexo obliquo. — Ins. Taprobane mont. : Maturata!

S. stelligera sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus, linea marginali exili alba cinctus, pilis squamiformibus longis pronis et striatis cinereo-micantibus, ad marginem frontalem pilis viridi-aureis mixtis, supra vestitus, utrinque in declivitate, pilis longioribus albis munitus et supra oculos medios macula frontali nivea ornatus. Pili oculorum albid. Clypeus ad marginem setis albis longis uniseriatis munitus. Abdomen oblongum, atrum, squamulis micantibus cinereis viridibusque vestitum, antice linea marginali arcuata, supra punctis parvis biseriatis, utrinque maculis trinis majoribus obliquis, maculaque apicali niveo-pilosis decoratum, subtus albo-pilosum. Sternum nigrum. Chelæ nigricantes, antice inæquales et rugatæ. Pedes longe albo-pilosi, antici reliquis robustiores, obscure fuscis, versus extremitates sensim dilutiores, postici lutei, coxis fuscis, tibiis metatarsisque apice anguste fusco-annulatis. Pedes-maxillares depressi, creberrime niveo-squamulati. — Ins. Taprobane : Colombo!

Pilia (1) **saltabunda** sp. nov. — ♂. Long. 4-5 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter granulatus, supra rufulo-pubescent, utrinque in declivitate et postice in medio longius luteo-pilosus, parte cephalica utrinque, prope oculos posticos, fasciculo erecto setarum nigrarum ornata. Pili oculorum pauci rufuli. Clypeus angustus, pilis longis fulvo-rufulis munitus. Abdomen breve, vix longius quam latius, postice breviter acuminatum, fusco-rufulum, plus minus nigricanti-variegatum, rufulo-pubescent, antice vitta marginali lineaque media abbreviata, postice vitta transversa latissima, leviter recurva, luteo-pilosis, ornatum, subtus nigricans, parce albido-pilosum. Chelæ latæ, antice paululum deplanatæ, fusco-rufulæ, parce et minute granulosa. Partes oris sternumque nigro-olivacea lævia. Pedes 1ⁱ paris crassi et longissimi, nigricantes vel castanei, tarso parvo luteo, luteo-pubescentes, patella tibia metatarsoque subtus longe nigro-ciliatis, tibia supra prope apicem, cristula parva nigra ornata. Pedes sex postici lutei, coxis femoribusque infuscatis, reliquis articulis sæpe confuse annulatis. Pedes-maxillares parvi et graciles, lutei, leviter fusco-variati, flavo-nitido-pilosi; tibia patella multo brevior, angustior, extus ad apicem apophysi nigra, parva, acutissima et valde uncata armata; tarso angusto teretiusculo; bulbo simplici. — India merid. : Kodaikanal (Palni Hills).

(1) *Pilia* nov. gen. a *Tara* Peckh. (*Atrytone* Keyserling) differt cephalothorace brevi et alto, antice posticeque declivi, oculis anticis in lineam rectam, lateralibus a mediis distantibus. — Typus *P. saltabunda* E. Simon.

Belliena (1) **biocellosa** sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, lævis et glaber, parte cephalica paulo obscuriore, utrinque prope oculos late nigra, parce sed longe albido-pilosa. Pili oculorum albi. Clypeus nudus partes oris, chelæ, sternum pedesque luteo-ravida. Abdomen pallide luteum, supra duriusculum, nitidissimum et glabrum sed ad marginem anticum setis validis nigris paucis munitum, in parte basali lineis binis leviter curvatis, antice convergentibus, sæpe interruptis, maculisque binis submediis subgeminatis longis et obliquis fuscis, in parte apicali maculis nigerrimis binis magnis et subquadratis decoratum. Pedes maxillares lutei, tarso fusco-olivaceo; tibia patella multo brevior et paulo angustior, apophysi apicali nigra parva et acuta extus armata; tarso ovato; bulbo maximo, ad basin valde convexo et prominulo, ad apicem attenuato et stylo parvo subrecto munito.

♀. Long. 3 mill. — Abdomen molle, pallide luteum, ad marginem anticum macula parva transversa, dein maculis majoribus binis subrotundis, prope medium maculis binis geminatis linearibus et utrinque macula majore obliqua, fuscis, prope apicem maculis binis maximis nigerrimis supra decoratum. Area genitalis plagulis binis planis subrotundis rufescentibus notata. — Venezuela : San Esteban!

B. phalerata sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, nitidus, parte cephalica parce et breviter luteo-pilosa, thoracica glabra sed in medio confuse dilutior et linea exili niveo-pilosa ornata. Pili oculorum albi. Clypeus nudus. Chelæ, partes oris sternumque fusco-olivacea, glabra et lævia. Abdomen scuto niger-rimo nitido et glabro sed antice macula parva niveo-pilosa ornato, supra omnino obtectum, tubere anali niveo-piloso, subtus obscure testaceum. Pedes pallide flavidi, tibiis anticis aculeis debilibus inferioribus aculeisque parvis interioribus trinis munitis, patellis intus minute aculeatis, metatarsis aculeis inferioribus aculeoque parvo apicali interiore armatis. Pedes-maxillares fere præcedentis sed nigri, femore supra crasse albo-piloso. — Venezuela : Caracas!

B. flavimana sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, nitidus, parte cephalica parce albo-luteo-pilosa, thoracica glabra leviter dilutior. Pili oculorum albi. Clypeus parce et crasse albo-barbatus. Chelæ et partes oris fulvæ. Sternum fusco-olivaceum, læve. Abdomen scuto nigro nitido et glabro supra omnino obtectum.

(1) *Belliena* nov. gen. a *Nagaima* (Peckham) differt quadrangulo oculorum postice quam antice paulo angustiore, oculis parvis ser. 2^æ fere in medio inter oculos laterales anticos et posticos sitis, tegumentis lævibus et nitidis. — Typus : *B. biocellosa* E. Simon.

tum, subtus olivaceum, tubere anale niveo-piloso. Pedes flavidi, tibia 1ⁱ paris aculeis inferioribus debilibus 2-2 aculeoque parvo interiore minuto armata, patella mutica, tibia 2ⁱ paris aculeis binis uniseriatis subtus munita. Pedes-maxillares flavidi, femore supra albo-piloso; femore robusto et curvato; patella convexa; tibia patella multo brevior et paulo angustior, apophysi apicali recta, antice directa, articulo longior, extus armata; tarso sat longe ovato; bulbo ad basin valde convexo. — Venezuela : Colonia Tovar!

Nagaina diademata sp. nov. — ♀. — Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus, squamulis viridi-aureis conspersus, vitta grosse niveo-squamulata coronatus lineaque exiliore alba cinctus. Pili oculorum sordide albidi. Clypeus ad marginem setis albis longis paucis uniseriatis munitus. Abdomen breviter oblongum, nigrum, parce nitido-squamulatum, albo-marginatum, prope medium linea transversa procurva, prope apicem linea recurva, in medio late interruptis, grosse albo-cœruleo-squamulatis, decoratum, subtus parce albo-pilosum. Chelæ nigro-nitidæ, leviter coriaceo-rugatæ. Sternum nigrum, parce albo-pilosum. Pedes nigri, tarsis cunctis, metatarsis 2ⁱ et 3ⁱ parium, coxis trochanteribusque quatuor posticis luteis. Pedes-maxillares nigri. Area genitalis fovea superficiali magna, semicirculari et postice acute emarginata, impressa. — Brasilia, prov. Minas : Caracá (E. Gounelle).

N. tricincta sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, coriaceus, cinereo-pubescens, parte cephalica squamulis viridi-aureis parce ornata, thoracica pone oculos, maculis albo-squamulatis notata. Pili oculorum et clypei pauci albi. Abdomen breviter ovatum, nigrum, in parte basali squamulis viridi-aureis conspersum, lineis exilibus albo-squamulatis, inter se fere æquidistantibus, transversim sectum, linea 1^a angulosa, reliquis recurvis, subtus nigrum et parce cinereo-pilosum. Sternum nigro-nitidum. Chelæ mediocres, nigrae, inordinatim striatæ. Pedes omnino flavidi, tibia 1ⁱ paris aculeis 2-2, tibia 2ⁱ paris aculeis 4-2, metatarsis quatuor anticis aculeis parvis 2-2 subtus armatis. Plaga genitalis in medio minute foveolata, postice rufula et transversim elevata. — Amazonas : Sao Paulo de Olivença (de Mathan).

Hyetussa (1) **cribrata** sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, grosse et crebre impresso-punctatus, parte cephalica

(1) *Hyetussa* nov. gen. a *Belliena* differt cephalothorace longo et fere parallelo, oculis ser. 2^æ longe ante medium, inter oculos laterales anticos et posticos, sitis, tibiis quatuor anticis muticis, pedibus posticis muticis vel fere muticis, tegumentis cephalothoracis grosse impresso-punctatis. — Typus : *H. cribrata* E. Simon.

ad marginem frontalem, thoracica in medio atque ad marginem longe albo-pilosis. Pili oculorum albi. Clypeus utrinque breviter, in medio longe et crebre albo-barbatus. Chelæ sternumque nigro-nitida. Abdomen longum et teretiusculum, supra atro-lividum, vittis transversis latis, medianis angulosis et sæpe in medio interruptis, paulo dilutioribus et albo-pilosis decoratum. Pedes pallide flavidi, parce albo-pilosi, tibiis metatarsisque anticis vix distincte olivaceo-annulatis. Plaga genitalis fulva, albo-pilosa, magna et semicircularis, septo medio angusto divisa. — Venezuela : Caracas!

Tanybelus (1) *æneiceps* sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax longus, fere glaber, parcissime et tenuiter albido-pilosus, parte cephalica subtiliter coriacea nigro-ænea, thoracica lævi, castanea. Oculi antichi inter se contigui et valde inæquales, medii maximi, pilis albis paucis et crassis cincti. Clypeus sat latus, pilis albis crassis et longis, crebre uniseriatis, ad marginem ornatus. Abdomen longum, teretiusculum, supra pallide fusco-testaceum, vitta media lata obscuriore confusa et prope medium utrinque vitta transversa albido-testacea et albo-pilosa ornatum, subtus albido-testaceum utrinque et postice anguste nigro-marginatum. Chelæ debiles, parallelæ, intus marginatæ, nigro opacæ, marginibus sulci longe obliquis, inferiore carinula remota sat parva, acute bidentata, armato, ungue longo valido et curvato. Partes oris sternumque nigricantia. Laminæ apice dilutiores. Pedes flavidi, pedes 1ⁱ paris sat breves, reliquis paulo robustiores, aurantiaco-tincti, femore tibiaque utrinque plus minus infuscatiss et subvittatis, tarso parvo fusco, tibia aculeis parvis sed validis 3-3 subtus armata, metatarso tibia multo brevior, aculeis 2-2 majoribus et intus aculeo simili submedio, armato. Pedes 2ⁱ paris similiter aculeati sed tibiæ aculeis exterioribus longioribus. Pedes postici minutissime et parcissime aculeati. Pedes-maxillares nigri, sat validi et longi; femore sat crasso et curvato; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia parva, patella fere triplo brevior, extus apophysi apicali fere inferiore, brevi, acuta et antice directa armata; tarso sat parvo, anguste ovato, apice inflexo; bulbo ovato, ad basin convexo. — Venezuela : Colonia Tovar!

Atomosphyrus (2) *tristiculus* sp. nov. — ♂ (pullus). Long. 3 mill. — Cephalothorax longus, niger et fere glaber, subtiliter

(1) *Tanybelus* nov. gen. a *Hyetussa* differt tibiis anticis aculeis sat validis 3-3 subtus armatis, metatarsis anticis aculeis inferioribus aculeoque laterali interiore submedio munitis, tegumentis cephalothoracis subtiliter coriaceis haud punctatis. — Typus : *T. æneiceps* E. Simon.

(2) *Atomosphyrus* nov. gen. a *Tanybelo* differt quadrangulo oculorum postice quam antice paulo latiore, tibiis anticis gracilibus et longis aculeis debilibus 2-2 tantum munitis, metatarsis aculeis inferioribus munitis sed aculeis lateralibus carentibus. — Typus : *A. tristiculus* E. Simon.

coriaceus et opacus. Pili oculorum pauci crassi albi. Clypeus parce albo-barbatus. Abdomen longum, nigrum, antice vitta transversa, utrinque prope medium, macula parva longa niveo-squamulatis decoratum. Chelæ nigrae, valde coriaceo-rugosae, pilis crassis albis, paucis intus munitæ, margine inferiore sulci carinula brevi, profunde et acute bidentata, armato. Partes oris sternumque nigra. Pedes 1ⁱ paris sat longi, graciles et teretes sed femore compresso sat lato, lutei, coxa femoreque nigris, tarso ad basin infuscato, tibia utrinque squamulis albis uniseriatis ornata, subtus aculeis debilibus 2-2, a sese late distantibus, munita, metatarso tibia brevior, similiter aculeato. Pedes sex postici nigricanti-olivacei, coxis tarsisque dilutioribus et fulvis. Pedes-maxillares breves et robusti, tarso bulboque maximis. — Chili : Valdivia.

Rhetenor (2) **diversipes** sp. nov. — ♀. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax nigro-æneus, nitidissimus, parcissime et tenuiter pilosus, parce et grosse punctato-impressus et prope marginem posticum rugulosus. Abdomen cephalothorace paulo latius, convexum, nigerrimum, nitidum, subtilissime et perparce punctatum. Pedes-maxillares nigri. Pedes flavi, femore 1ⁱ paris fusco-rufescenti, femore 4ⁱ paris nigro, patellis tibilisque cunctis nigro-annulatis et sublineatis, metatarso 1ⁱ paris nigro, 2ⁱ paris antice nigro-lineato. Plaga genitalis plana, fusca et rugosa, semicircularis, postice costa transversa rufula discreta. — Regio Amazonica : Teffe (de Mathan).

(2) **Rhetenor** nov. gen. a *Zygoballo* differt cephalothorace latiore postice quam longiore et postice utrinque pone oculum prominulo, oculis anticis apicibus in lineam procurvam. — Typus : *R. diversipes* E. Simon.
